

据以前,我们仍将其作为四个不同的种来处理。

本种与鹅耳枥的区别只在于叶较大、较厚、叶脉较多,叶下面有疣状突起;与川陕鹅耳枥的区别在于叶较大,叶下面有疣状突起;与云贵鹅耳枥的区别在于小坚果无毛。所列举的这些区别特征也不是绝对的,在分布区交叉处,过渡类型常可见到。

产于南京宝华山的植物过去被订为长圆形鹅耳枥 *C. oblongifolia* Hu et Cheng, 在描述中是以叶为倒卵状矩圆形、椭圆状矩圆形、卵状披针形为特征,但就南京宝华山的标本来看,其叶形也是比较多变的,除了叶形以外,与湖北西部的植物无明显区别,故南京宝华山的植物应属本种范围。此外,过去所订的长柄鹅耳枥 *C. longipes* Hu、胡氏鹅耳枥 *C. huana* Hu 等均有类似情况,因此都并入本种。

川鄂鹅耳枥(变种)(秦岭植物志)

Carpinus hupeana Hu var. *henryana* (H. Winkl.) P. C. Li, stat. nov.
——*Carpinus tschonoskii* Maxim. var. *henryana* H. Winkl. in Engler, Pflanzenreich 19 (IV-61): 36. 1904.——*Carpinus henryana* (H. Winkl.) H. Winkl. in Engler, Bot. Jahrb. 50 (Suppl.): 507. fig. 7. 1914; Schneid. in Sarg., Pl. Wils. 2: 429. 1916; 陈嵘, 中国树木分类学 165. 1937; 胡先骕, 中国森林树木图志 2: 193. 图版 80. 1948; 秦岭植物志 1 (2): 64. 图 53. 1974.——*Carpinus polyneura* auct. non Franch., Burk. in Journ. Linn. Soc. Bot. 13: 501. 1899. p. p.

乔木,高 13—17 米。叶狭披针形,长 5—8 厘米,宽 2—3 厘米,边缘具稍内弯的单锯齿。

产于广东阳山、湖北西部、四川巫山、河南卢氏、陕西南部、甘肃东部。生于海拔 1600—2900 米的山地林中。模式标本采自四川巫山。

单齿鹅耳枥(变种)(中国森林树木图志)

Carpinus hupeana Hu var. *simplicidentata* (Hu) P. C. Li, stat. nov.
——*Carpinus simplicidentata* Hu, 静生汇报 n. ser. 1: 143. 1948; 秦岭植物志 1 (2): 64. 1974.——*Carpinus seemeniana* auct. non Diels, Hu, 中山大学农林植物所专刊 1: 119. 1933. 中国植物图谱 3: 图版 126. 1933.

乔木,高约 10 米。叶卵形或长卵形,长 3—3.5 厘米,宽 1.5—3 厘米,边缘具齿状单锯齿。

产于湖北西部、陕西南部、甘肃东部。生于海拔 800—2000 米山坡杂木林中。模式标本采自湖北西部。

19. 紫脉鹅耳枥

Carpinus purpurinervis Hu, 植物分类学报 9 (3): 293. 1964.

小乔木,高约 5 米;枝条暗灰色;小枝略带紫色,近无毛。托叶条形,褐色,纸质,长约 7 毫米;叶厚纸质,矩圆披针形、披针形或狭披针形,长 2—5 厘米,宽 1—1.7 厘米,顶端渐