

产广东东北部（乳源）、贵州南部（雷公山）。生于海拔1 200—1 400米的山谷杂木林中。模式标本采自广东乳源县。

9. 滑壳柯(广西植物) 图版 26: 8—12

Lithocarpus levis Chun et Huang [贵州植物志 1: 95. 1982. nom. nud.] in Guihaia 8(1): 2. 1988.

乔木，高10—15米，胸径30—50厘米。嫩枝有浅槽棱，二年生枝暗褐色，有少数皮孔，干后变灰棕色；芽小，卵圆形，干后芽鳞有树脂质物，枝、叶无毛。叶略硬纸质，卵状长椭圆形或椭圆形，长13—20厘米，宽4—7厘米，顶部渐尖，基部宽楔形，全缘，中脉在叶面平坦或微凸起，侧脉每边12—16条，在叶缘附近急弯向上，彼此不连接，支脉明显，彼此近于平行，叶背有紧实的蜡鳞层，干后略带灰色；叶柄长1—1.5厘米。雄穗状花序单穗腋生，长6—9厘米，花序轴被短柔毛；雌花每3朵一簇。果序长6—8厘米，轴粗7—8毫米，有皮孔，幼嫩壳斗有具细裂齿的肋状环圈，成熟壳斗有线纹状环圈或仅有痕迹；壳斗椭圆形，两端狭，全包坚果，仅宿存花柱外露，高15—20毫米，宽12—16毫米，壳壁厚约1毫米，有干后为黄或棕灰色的蜡鳞层；坚果宽椭圆形，果壁由顶至基部逐渐增厚，厚1.5—3毫米，顶部被细伏毛，果脐占坚果面积的绝大部分。花期8—9月，果次年9—10月成熟。

产贵州南部（凯里、兴仁、雷山）等地。生于海拔900—1 500米山地常绿阔叶林中，常被砍伐，故呈灌木状。模式标本采自贵州雷山县（雷公山）。

10. 杏叶柯 红椆、岭梅（海南岛），杏叶石栎

Lithocarpus amygdalifolius (Skan) Hayata, Gen. Ind. Fl. Form. 72. 1917; A. Camus, Chenes 3: 654. 1954, Atlas pl. 377, f. 22—32. 1948; Li, Woody Fl. Taiwan 89. 1963; 中国高等植物图鉴 1: 427. 图854. 1972; 台湾植物志 2: 81. 图219. 1976. — *Quercus amygdalifolia* Skan in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 506. 1899. — *Pasania amygdalifolia* (Skan) Schott. in Bot. Jahrb 47: 660. 1912. — *Synaedrys amygdalifolia* (Skan) Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 30: 188. 1916.

10a. 杏叶柯(原变种) 图版 29: 2—4

var. *amygdalifolius*

乔木，高达30米，胸径达2米。春夏季抽出的新枝及嫩叶背面密被黄棕色卷柔毛，秋后毛全部脱落。叶厚革质，披针形或狭长椭圆形，长8—15厘米，宽2.5—4厘米，萌生枝的叶长达20厘米，宽达9厘米，部长渐尖或短突尖，基部楔形，全缘，有时少数叶片的顶部边缘浅波状，侧脉每边10—14条，中脉的下段在叶面微凸起，支脉不明显或隐约可见，嫩叶干后叶面常有油润光泽，成长叶的叶背有较厚的蜡鳞层，带灰色；叶柄长1—2厘米。雄穗状花序单穗腋生或多穗排成圆锥花序，花序轴密被柔毛；雌花每3朵一簇，有时兼有单朵散生。壳斗近圆球形，径2—2.5厘米，全包坚果，小苞片三角形，或多边形，通常与壳壁融合，呈不连续的环状，较幼嫩的壳斗，其上部的小苞片仍为三角形