

也有。

本种可能是 *L. olla* (Kurz) A. Camus 的同物异名, 因后者仅有果的标本, 不能确定。

19. 石屏柯 (广西植物)

Lithocarpus talangensis Huang et Y. T. Chang in *Guihaia* 8(1): 21. 1988. — *L. dealbata* (Hook. f. et Thoms.) Rehd. subsp. *mannii* (King) A. Camus var. *yunnanensis* A. Camus, *Chenes* 3: 927. 1954, Atlas pl. 451, f. 19–20. 1947, Expl. pl. 93. 1948. — *L. shipingensis* Huang et Y. T. Chang, 中国高等植物图鉴, 补篇 1: 85. 1982, nom. tantum.

乔木, 高 15—25 米, 胸径 30—60 米。一年生枝与嫩叶叶背均密被短柔毛, 二年枝的毛大多脱落, 有明显的灰黄色皮孔。叶革质, 长椭圆形, 长 12—20 厘米, 宽 4—7 厘米, 顶部短渐尖, 基部楔形, 全缘, 中脉在叶面微凸起, 被疏长毛, 侧脉每边 10—14 条, 在叶面细裂槽状凹陷, 支脉略明显, 叶背并被暗灰棕色甚细的毛状蜡鳞, 二年生的叶背有紧实的蜡鳞层; 叶柄长 1—1.5 厘米。雄穗状花序多穗组成圆锥花序, 长达 27 厘米, 花序轴被短柔毛; 雌花序长 5—15 厘米, 2—4 穗聚生于枝的上部; 雌花每 3 朵一簇, 花柱长 1—1.5 毫米, 果序轴基部粗 5—8 毫米; 壳斗陀螺形, 中部稍上最宽, 高 20—25 毫米, 宽 18—26 毫米, 包着坚果超过一半, 小苞片三角形或菱形, 位于壳斗中部以下的大部分与壳壁愈合, 被褐灰色微毛及鳞秕; 坚果近圆球形, 高 15—18 毫米, 宽 16—26 毫米, 或较小, 顶部平缓或凹陷, 被细伏毛, 果脐占坚果面积 $1/2$ — $2/3$ 。花期 5—6 月, 果次年 10—11 月成熟。

产云南南部 (绿春、元江、石屏等地)。生于海拔 200—2400 米山地常绿阔叶林中。模式标本采自云南墨江县。

20. 截果柯 截头石栎、截头柯

Lithocarpus truncatus (King) Rehd. et Wils. in *Sarg. Pl. Wils.* 3: 207. 1917; A. Camus, *Chenes* 3: 645. 1954, Atlas pl. 377. 1948; 中国高等植物图鉴 1: 427, 图 853. 1972. — *Quercus truncata* King in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 5: 618. 1888 et in *Ann. Roy. Bot. Gard. Calc.* 2: 84, t. 80. 1889. — *Pasania truncata* (King) Schott. in *Bot. Jahrb.* 47: 633. 1912. — *Quercus cathayana* Seem. in *Fed. Rep. Sp. Nov.* 3: 53. 1906. — *Pasania cathayana* (Seem.) Schott. in l. c. 47: 663. 1912. — *Synaedrys cathayana* (Seem.) Koidz. in *Bot. Mag. Tokyo* 30: 188. 1916. — *Lithocarpus cathayana* (Seem.) Rehd. in *Journ. Arn. Arb.* 1: 123. 1919. — *Pasania hypoglauca* Hu Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 10: 101. 1940, pro parte. — *Lithocarpus chienchuanensis* Hu in *Acta Phytotax. Sin.* 1: 106. 1951, pro parte. — *L. grandicupula* Hsu, Ho et Dong in *Acta Bot. Yunnan.* 5(4): 335, pl. 2, f. 1–3. 1983.

20a. 截果柯(原变种)

var. *truncatus*

乔木, 高达 30 米, 胸径达 80 厘米。二年生枝有灰黄色微凸起的皮孔, 枝叶无毛。叶薄革质, 狭长椭圆形或披针形, 长 10—25 厘米, 宽 3—7 厘米, 两端狭尖, 全缘, 中脉在