

10 毫米。

木材淡紫褐色，纵切面灰棕带红色，年轮不明显，木材纹理通直，结构密致，材质稍软，纵切面平滑而有光泽，材色一致，加工较易，但干燥时易爆裂并稍变形，适作家具材。

113. 木姜叶柯 甜茶(通称)、甜叶子树(云南)、胖桐(广东)

*Lithocarpus litseifolius* (Hance) Chun in Journ. Arn. Arb. 9: 152. 1928; A. Camus, Chenes 3: 1084. 1954, Atlas pl. 494, f. 7–10. 1948; 海南植物志 2: 354. 1965; 中国高等植物图鉴 1: 437, 图 874. 1972. — *Quercus litseifolia* Hance in Journ. Bot. 22: 229. 1884; Skan in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 518. 1889; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 61. 1927. — *Pasania litseifolia* (Hance) Schott. in Bot. Jahrb. 47: 668. 1912. — *Synaedrys litseifolia* (Hance) Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 30: 196. 1916. — *Quercus synbalanos* Hance in Journ. Bot. 22: 228. 1884. — *Pasania synbalanos* (Hance) Schott. in l. c. 675. — *Lithocarpus synbalanos* (Hance) Chun in l. c. 152; A. Camus, Chenes 3: 1170, 1954, Atlas pl. 522, f. 1–3. 1948. — *Pasania viridis* Schott. in l. c. 668, pro max. parte, excl. A. Henry 9636 [= *L. dealbatus* (Hook. f.) Rehd.]. — *Synaedrys viridis* (Schott.) Koidz. in l. c. 198. — *Lithocarpus viridis* (Schott.) Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 3: 210. 1916; Fang, Ic. Pl. Omei 2, pl. 119. 1945, pro max. parte. — *Pasania mucronata* Hick. et A. Camus in Ann. Sci. Nat. Bot. 10, ser. 3: 393, f. 3. 1921. — *Lithocarpus mucronata* (Hick. et A. Camus) A. Camus in Bull. Soc. Bot. Fr. 92: 254. 1945 et Chenes 3: 1071. 1954, Atlas pl. 491, f. 20–33. 1948. — *Pasania wenshanensis* Hu in Acta Phytotax. Sin. 1: 113. 1951. — *P. lysistachya* Hu in l. c. 117. — *Quercus polystachya* auct. non Wall. ex DC.; Skan in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 519. 1899. — *Lithocarpus polystachya* auct. non (Wall. ex DC.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 1: 130. 1919, quoad pl. e Yunnan: 中国高等植物图鉴 1: 434, 图 867. 1972; Y. C. Hsu et H. W. Jen in Acta Phytotax. Sin. 14(2): 77. 1976. 及云南植物志 2: 306. 图 89(1–3). 1979; 贵州植物志 1: 102. 图 99. 1982; et auct. plur.

113a. 木姜叶柯(原变种) 图版 63

var. *litseifolius*

乔木，高达 20 米，胸径 60 厘米，枝、叶无毛，有时小枝、叶柄及叶面干后有淡薄的白色粉霜。叶纸质至近革质，椭圆形、倒卵状椭圆形或卵形，很少狭长椭圆形，长 8—18 厘米，宽 3—8 厘米，顶部渐尖或短突尖，基部楔形至宽楔形，全缘，中脉在叶面凸起，侧脉每边 8—11 条，至叶缘附近隐没，支脉纤细，疏离，两面同色或叶背带苍灰色，有紧实鳞秕层，中脉及侧脉干后红褐色或棕黄色；叶柄长 1.5—2.5 厘米。雄穗状花序多穗排成圆锥花序，少有单穗腋生，花序长达 25 厘米；雌花序长达 35 厘米，有时雌雄同序，通常 2—6 穗聚生于枝顶部，花序轴常被稀疏短毛；雌花每 3—5 朵一簇，花柱比花被裂片稍长，干后常油润有光泽。果序长达 30 厘米，果序轴纤细，粗很少超过 5 毫米；壳斗浅碟