

10—11月。

产江西(南部)、广东、广西等省区。生于海拔400—1000米的常绿阔叶林中。喜湿润,在海南岛山地森林中为上层树种,伴生树种有青梅、油丹、海南暗罗及海南黄叶树等。模式标本采自海南崖县。

65. 盈江青冈

Cyclobalanopsis yingjiangensis Y. C. Hsu et Q. Z. Dong in Acta Bot. Yunnan. 5: 341. f. 4, 2. 1983.

常绿乔木,高达20米。小枝纤细,干时黑紫色,稍具沟槽,近无毛;皮孔灰色明显。叶片卵状披针形,长9—12厘米,宽3—4厘米,先端渐尖,基部圆形,宽楔形或偏斜,叶缘有明显锯齿,侧脉每边9—11条,叶面淡绿色,叶背粉绿色,被易脱落的疏生星状毛或无毛;叶柄纤细,长1—1.5厘米。果单生,壳斗盘形,直径约3厘米,厚约2毫米。坚果卵状圆锥形,直径3厘米,高2厘米。

产云南盈江。生于海拔2500米的山地。模式标本采自盈江。

66. 褐叶青冈 黔桐(中国高等植物图鉴)

Cyclobalanopsis stewardiana (A. Camus) Y. C. Hsu et H. W. Jen in Acta Bot. Yunnan. 1: 148. 1979; 贵州植物志 1: 109. 1982; 中国树木志 2: 2321. 1985. — *Quercus stewardiana* A. Camus, Chenes 1: 273. 1936—38, Atlas 1. Pl. 10. f. 8—10. 1934; 中国高等植物图鉴, 补编 1: 124. 1982.

66a. 褐叶青冈(原变种) 图版 96: 8—10

var. *stewardiana*

常绿乔木,高12米。小枝无毛。叶片椭圆状披针形或长椭圆形,长6—12厘米,宽2—4厘米,顶端尾尖或渐尖,基部楔形,叶缘中部以上有疏浅锯齿,侧脉每边8—10条,在叶面不明显,在叶背凸起,幼叶两面被丝状单毛,老时无毛或仅叶背有疏毛,叶面深绿色,叶背灰白色,干后带褐色;叶柄长1.5—3厘米,无毛。雄花序生于新枝基部,长5—7厘米,花序轴密生棕色绒毛;雌花序生于新枝叶腋,长约2厘米,花序轴及苞片被棕色绒毛。壳斗杯形,包着坚果1/2,直径1—1.5厘米,高6—8毫米,内壁被灰褐色绒毛,外壁被灰白色柔毛,老时渐脱落;小苞片合生成5—9条同心环带,环带常排列松弛,边缘有粗齿。坚果宽卵形,高、径约0.8—1.5厘米,无毛,顶端有宿存短花柱,果脐凸起。花期7月,果期翌年10月。

产浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州等省区。生于海拔1000—2800米的山顶、山坡杂木林中。模式标本采自贵州梵净山。

66b. 长尾青冈(变种)

var. *longicaudata* Y. C. Hsu, P. I. Mao et W. Z. Li in Acta Bot. Yunnan. 5: 338. f. 3. 1. 1983.

本变种与原变种不同处在于叶先端尾尖,尖头长1—2厘米,上部锯齿向内弯。果实