

4. 珊瑚朴 (中国树木分类学) 图版 127: 1—2

Celtis julianae Schneid. in Sarg. Pl. Wilson. 3: 265. 1916; 中国高等植物图鉴 1: 471. 图 941. 1972; 秦岭植物志 1(2): 87. 1974; 湖北植物志 1: 134. 图 166. 1976; 江苏植物志, 下册: 59. 图 810. 1982; 福建植物志 1: 424. 图 383. 1982; 贵州植物志 1: 125. 图 115. 4. 1982; 四川植物志 8: 160. 1985; 广东植物志 2: 222. 1991; 浙江植物志 2: 77. 图 2—98. 1992. — *C. julianae* Schneid. var. *calvescens* Schneid. l. c. 266. 1916.

落叶乔木, 高达 30 米, 树皮淡灰色至深灰色; 当年生小枝、叶柄、果柄老后深褐色, 密生褐黄色茸毛, 去年生小枝色更深, 毛常脱净, 毛孔不十分明显; 冬芽褐棕色, 内鳞片有红棕柔毛。叶厚纸质, 宽卵形至尖卵状椭圆形, 长 6—12 厘米, 宽 3.5—8 厘米, 基部近圆形或二则稍不对称, 一侧圆形, 一侧宽楔形, 先端具突然收缩的短渐尖至尾尖, 叶面粗糙至稍粗糙, 叶背密生短柔毛, 近全缘至上部以上具浅钝齿; 叶柄长 7—15 毫米, 较粗壮; 萌发枝上的叶面具短糙毛, 叶背在短柔毛中也夹有短糙毛。果单生叶腋, 果梗粗壮, 长 1—3 厘米, 果椭圆形至近球形, 长 10—12 毫米, 金黄色至橙黄色; 核乳白色, 倒卵形至倒宽卵形, 长 7—9 毫米, 上部有二条较明显的肋, 两侧或仅下部稍压扁, 基部尖至略钝, 表面略有网孔状凹陷。花期 3—4 月, 果期 9—10 月。


产四川北部和金佛山、贵州、湖南西北部、广东北部、福建、江西、浙江、安徽南部、河南西部和南部、湖北西部、陕西南部。多生于山坡或山谷林中或林缘, 海拔 300—1300 米。模式标本采自湖北巴东。

5. 西川朴 (中国高等植物图鉴) 图版 127: 3—4

Celtis vandervoetiana Schneid. in Sarg. Pl. Wilson. 3: 267. 1916; 中国高等植物图鉴 1: 471. 图 942. 1972; 湖北植物志 1: 135. 图 167. 1976; 福建植物志 1: 425. 图 384. 1982; 贵州植物志 1: 125. 图 115. 5. 1982; 四川植物志 8: 160. 图版 49: 6. 1985; 云南树木志, 中册: 653. 图 354: 5—6. 1990; 广东植物志 2: 222. 1991; 浙江植物志 2: 78. 图 2—101. 1992. — *C. pruniputaminea* E. W. Ma in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 123. 1980.

落叶乔木, 高达 20 米, 树皮灰色至褐灰色; 当年生小枝、叶柄和果梗老后褐棕色, 无毛, 有散生狭椭圆形至椭圆形皮孔; 冬芽的内部鳞片具棕色柔毛。叶厚纸质, 卵状椭圆形至卵状长圆形, 长 8—13 厘米, 宽 3.5—7.5 厘米, 基部稍不对称, 近圆形, 一边稍高, 一边稍低, 先端渐尖至短尾尖, 自下部 $2/3$ 以上具锯齿或钝齿, 无毛或仅叶背中脉和侧脉间有簇毛; 叶柄较粗壮, 长 10—20 毫米。果单生叶腋, 果梗粗壮, 长 17—35 毫米, 果球形或球状椭圆形, 成熟时黄色, 长 15—17 毫米; 果核乳白色至淡黄色, 近球形至宽倒卵形, 直径 8—9 毫米, 具 4 条纵肋, 表面有网孔状凹陷。花期 4 月, 果期 9—10 月。

产云南东部、广西、广东北部和西部、福建、浙江东部和东南部、江西南部、湖南西北部、贵州、四川。多生于山谷阴处、林中, 海拔 600—1400 米。模式标本采自四川云阳。



图版 127 1—2. 珊瑚朴 *Celtis julianae* Schneid.: 1. 果枝, 2. 果核 (放大), 3—4. 西川朴 *C. vandervoetiana* Schneid.: 3. 果枝, 4. 果核 (放大), 5—6. 大叶朴 *C. koraiensis* Nakai: 5. 果枝, 6. 果核 (放大). (冀朝桢绘)