

Symb. Sin. 7(1): 102. Taf. III. Abb. 1. 1929. — *C. tetrandra* Roxb. subsp. *sinensis* (Pers.) Y. C. Tang in Acta Phytotax. Sin. 17(1): 51. 1979. nom. illeg; 浙江植物志 2: 80. 图 2-104. 1992.

与四蕊朴的主要区别点在于：朴树的叶多为卵形或卵状椭圆形，但不带菱形，基部几乎不偏斜或仅稍偏斜，先端尖至渐尖，但不为尾状渐尖，时质地也不及前一亚种那样厚；果也较小，一般直径 5—7 毫米，很少有达 8 毫米的；落叶乔木。花期 3—4 月，果期 9—10 月。

产山东（青岛、崂山）、河南、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、广西、广东、台湾。多生于路旁、山坡、林缘，海拔 100—1 500 米。

9. 小果朴（湖北植物志） 樱果朴（贵州植物志） 图版 126: 3—4


Celtis cerasifera Schneid. in Sarg. Pl. Wilson. 3: 271. 1916; 湖北植物志 1: 137. 1976; 贵州植物志 1: 125. 1982; 中国高等植物图鉴补篇 1: 146. 图 8426. 1982; 西藏植物志 1: 510. 图 163: 3-4. 1983; 四川植物志 8: 162. 1985; 云南树木图志，中册: 656. 图 355: 5-6. 1990; 浙江植物志 2: 78. 图 2-99. 1992. — *C. taiyuanensis* E. W. Ma in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 124. 1980.

落叶乔木，高达 35 米，树皮灰褐色；当年生小枝幼时无毛，绿色，老后淡棕色至褐色，有散生皮孔，去年生小枝淡褐色至深褐色；冬芽棕色至深棕色，鳞片无毛，在去年生小枝或萌发枝上的芽苞大，长而尖，可长至 6 毫米。叶革质，卵形至卵状椭圆形，长 5—15 厘米，宽 2.5—7.5 厘米，基部近圆形，稍偏斜，先端长渐尖至具短尾尖，边缘具整齐锯齿可几达基部，无毛或仅叶背脉腋间有少量柔毛；叶柄长 5—10（—17）毫米，无毛。果通常单生叶腋（极少情况下，有 2—3 个果生于一极短的总梗上），果梗细长，长 2.5—4.5 厘米，无毛或基部有少量柔毛，果近球形，直径 10—13 毫米，成熟时为兰黑色；核近球形，直径约 9 毫米，具 4 条肋，表面有浅网孔状凹陷。花期 4 月，果期 9—10 月。

产西藏东南部、云南、四川、贵州、广西北部、湖南西北部、湖北（宜恩）、陕西南部、山西中部、浙江（天台）。多生于山坡灌丛或沟谷杂木林中，海拔 800—2 400 米。模式标本采自湖北房县。

10. 黑弹树（中国树木分类学） 小叶朴（种子植物名称），黑弹朴（四川植物志） 图版 128: 5—6

Celtis bungeana Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 71. 1852; Schneid. in Sarg. Pl. Wilson. 3: 269. 1916; 中国高等植物图鉴 1: 472. 图 943. 1972; 秦岭植物志 1(2): 87. 1974; 湖北植物志 1: 136. 图 170. 1976; 江苏植物志，下册: 60. 图 813. 1982; 贵州植物志 1: 125. 1982; 西藏植物志 1: 510. 图 162: 4-5. 1983; 四川植物志 8: 163. 图版 50: 6-9. 1985; 河北植物志 1: 275. 图 236. 1986; 辽宁植物志，上册: 277. 图版 107: 1-2. 1988; 云南树木图志，中册: 657. 图 356: 6-7. 1990; 内蒙古植物志，第二版 2: 116. 图版 4. 图 4. 1991; 浙江植物志 2: 79. 图 2-101. 1992. — *C. chinensis* Bunge in Mém. Sav. Etr. Acad. Sci. St. Pétersb. 2: 135. 1833. non



图版 126 1—2. 紫弹朴 *Celtis biondii* Pamp.: 1. 果枝, 2. 果核 (放大)。3—4. 小果朴 *C. cerasifera* Schneid.: 3. 果枝, 4. 果核 (放大)。(冯晋庸绘)