

1. 桑亚科 Subfam. MOROIDEAE

Engl. Nat. Pflanzenf. 3: 1. 70. 1889.

乔木、灌木、草本，具乳液。雄花花丝在花芽时内折，花药外向。

族 1. 水蛇麻族 Trib. Fatoueeae Bur.

Bur. in DC. Prodr. 17: 214. 1873.

草本，花为聚伞花序；雌雄花混生或雌花单生。

本族 1 属 2 种。分布于亚洲东部、澳大利亚、马来西亚。我国均产。

1. 水蛇麻属 *Fatoua* Gaud.

Gaud. in Freyc. Voy. 509. 1826; Miq. Fl. Ind. Bat. 1. Pars 2.
282. 1859.

草本。叶互生，边缘具锯齿；托叶早落。花单性同株，雌雄花混生，组成腋生头状聚伞花序，具小苞片；雄花，花被片 4 深裂，裂片镊合状排列；雄蕊 4 枚，花丝在花芽时内折；退化雌蕊很小；雌花，花被 4—6 裂，裂片排列与雄花同，子房歪斜，花柱稍侧生，柱头 2 裂，丝状，胚珠倒生。瘦果小，斜球形，微扁，为宿存花被包围，果皮稍壳质；种皮膜质，无胚乳，内曲，子叶宽，相等，胚根长，向上内弯。

本属有两种，分布亚洲东部、东南亚至澳大利亚北部及新喀里多尼亚等地。我国东南部、南部和中部常见，西南部少见。

模式种：水蛇麻 *Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai

分种检索表

1. 一年生草本；叶柄被柔毛；叶片膜质，卵圆形至宽卵圆形，基部稍下延成叶柄；花柱长 1—1.5 毫米，约长于子房 2 倍 1. 水蛇麻 *F. villosa* (Thunb.) Nakai
1. 多年生草本，叶柄具刚毛；叶片近纸质，三角状卵圆形，基部截形至近心形，不下延成叶柄；花柱长 2—2.5 毫米，较子房长 3—4 倍 2. 细齿水蛇麻 *F. pilosa* Gaud.

1. 水蛇麻 (中国高等植物图鉴) 小蛇麻 (台湾) 图版 1: 1—5

Fatoua villosa (Thunb.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo 41: 516. 1927; Ohwi, Fl. Jap.