

1 种。分布于热带亚洲。在我国仅产海南。

3. 叶被木 (海南植物志) 酒饼树 (海南) 图版 10: 6—9

Streblus taxoides (Heyne) Kurz, For. Fl. Burm. 2: 465. 1877; Corner in Gard. Bull. Sing. 19: 225. 1962. Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 66. 1994. — *Trophis taxoides* Heyne in Roth, Nov. Pl. Ind. Or. 368. 1821. — *Phyllochlamys taxoides* (Heyne) Koord. Exkursionsfl. Java 2: 89. 1912; 海南植物志 2: 374. f. 481. 1915.

有刺灌木, 高 2—3 米, 刺粗壮, 刺长 1—1.5 厘米; 小枝常弯曲, 一边被锈色短毛。叶互生, 排为两列, 近革质, 椭圆形或长圆状披针形, 长 2—8 厘米, 宽 1—3.5 厘米, 先端渐尖至钝尖, 基部渐狭成钝形, 全缘或中部以上有浅疏钝齿或近先端有 3 小齿, 侧脉 7—11 对; 叶柄短, 2—3 毫米长; 托叶披针形, 背面有 1 纵肋。花雌雄异株; 雄花序腋生; 被毛, 无总花梗, 花序头状或短总状, 具总苞, 苞片数轮, 干膜质, 长 2.5—3.5 毫米, 雄花具短梗, 花被片 4, 卵形至披针形, 先端有缘毛, 雄蕊与花被片同数对生, 花丝在芽时内折。开花时伸出花被片外, 花药球形, 退化雌蕊四方柱形; 雌花单生, 具梗, 有鳞片状苞片 2 枚, 花被片 4, 披针形, 具明显的脉纹, 结果时增大成叶状, 子房初时直, 后扁斜, 花柱分枝, 胚珠悬垂。核果球形, 直径 4—5 毫米, 基部一边肉质, 顶部有小瘤体, 藏于增大宿存的叶状花被内。花期 4—5 月。

产海南。生于低海拔干旱、阳光充足的山坡灌木丛中。斯里兰卡、印度、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾也有分布。

组 3. 假鹊肾树组 Sect. *Pseudostreblus* (Bur.) Corner in Gard. Bull. Sing. 19: 217. 1962. — *Pseudostreblus* Bur. in DC. Prodr. 17: 219. 1873.


无刺乔木或灌木; 雌雄同株; 雄花序分枝为蝎尾状聚伞花序, 花 5 数; 雌花单生, 花 4 数; 核果大, 不开裂。

1 种, 分布印度、泰国、马来西亚。我国产广东、海南、广西、云南。

4. 假鹊肾树 (海南植物志) 图版 9: 4—5

Streblus indicus (Bur.) Corner in Gard. Bull. Sing. 19: 226. 1962; — Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 66. 1994. — *Pseudostreblus indicus* Bur. in DC. Prodr. 17: 219. 1873; Merr. et Chun in Sunyats. 3: 25. 1934; 海南植物志 2: 373, f. 479. 1965; 中国高等植物图鉴 1: 478, f. 955. 1972; 云南种子植物名录, 上册: 712. 1984.

无刺乔木, 高可达 15 米, 胸径 15—20 厘米, 有乳状树液; 树皮褐色, 平滑; 幼枝微被柔毛。叶革质, 排为两列, 椭圆状披针形, 幼树枝之叶狭椭圆状披针形, 长 7—15 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 全缘; 表面绿色, 背面浅绿色, 两面光亮, 无毛, 尖端钝尖或为尾



图版 10 1—2. 刺桑 *Streblus ilicifolius* (Vidal) Corner; 1. 果枝, 2. 果实。3. 尾叶刺桑 *S. zeylanicus* (Thw.) Kurz; 果枝。4—5. 双果桑 *S. macrophyllus* Bl.; 4. 叶, 5. 果实。6—9. 叶被木 *S. taxoides* (Heyne) Kurz; 6. 果枝, 7. 叶状苞片, 8. 小核果, 9. 叶。 (张培英绘)