

海南、广西、福建、台湾、浙江。海拔 300—1000 (—2100) 米。斯里兰卡、印度 (包括安达曼群岛)、不丹、缅甸、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚至所罗门群岛和澳大利亚北部均有分布。

常用作行道树，为良好的荫蔽树种；木材纹理细致，美观，可供雕刻。

本种特别是下一变种，以前多误定为 *Ficus lacor* Buch.-Ham.，但该种小枝、托叶及榕果均被较厚的长柔毛或绒毛，榕果一般径约 10 毫米，仅分布于印度南部、喜马拉雅山区诸国、缅甸、柬埔寨及越南中部。

3b. 黄葛树 (四川) (中国树木分类学) 黄桷树 (四川) 图版 20: 6—7

Ficus virens Ait. var. *sublanceolata* (Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 377. 1959. et 21: 9. 1965; 湖北植物大全: 269. 1992. — *F. saxophila* Bl. var. *sublanceolata* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 260. 1867. — *F. caulobotrya* (Miq.) Miq. var. *fraseri* Miq. l. c. 287. 1867. — *F. lacor* auct. non Buch.-Ham.; auct. pl. Fl. Sin.

本变种叶近披针形，长可达 20 厘米，先端渐尖；榕果无总梗。 花果期 4—7 月。

分布区与原变种相同。但在我国产陕西南部，湖北 (宜昌西南)、贵州、广西 (百色、隆林)、四川 (广布)、云南 (除西北外几近全省) 等地。常生于海拔 (400—) 800—2200—(2700) 米，为我国西南部常见树种，在四川 (沿长江城镇) 多见于江边的道旁，为良好的遮荫树。树冠广展，板根延伸至数 10 米处；支柱根形成的树干，胸径达 3—5 米。

系 2. 华丽榕系 Ser. *Superbae* Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 371. 1959; in *ibid.* 21: 9. 1965.

榕果内壁有较少的刚毛，基生苞片脱落，有总梗。

热带亚洲经巴布亚新几内亚至澳大利亚。

我国有下列 2 种 2 变种。

4. 华丽榕 (新拟)

Ficus superba Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 287. 1867; King in Ann. Bot. Gard. Calcutt. 1: 59. t. 72. 1888; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 92. 1929 (excl. syn.); Corner in Gard. Bull. Sing. 21 (1): 7. 1965. — *Urostigma superbum* Miq. Fl. Jungh. 446. 1884.

原变种中国不产，主要特征为，榕果直径 7—25 毫米，总梗长 3—35 毫米；叶宽椭圆形，长 5—14 厘米；托叶被黄色柔毛。

产马来西亚、柬埔寨、泰国、越南 (南部)、印度尼西亚等地。除下列变种外，尚有一个变种产越南北部下龙湾，一变种产澳大利亚 (昆士兰)。

4a. 笔管榕 (变种)