

Bl. var. *affinis* (Wall. ex Kurz) King et var. *concinna* (Miq.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 50. 1887. — *F. fecundissima* Lévl. et Vant. in Fedde Rep. Sp. Nov. 9: 19. 1911; Lévl., Fl. Kouy-Tchéou 430. 1915 — *F. pseudoreligiosa* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 432. 1915. — *F. lacor* auct. non Buch.-Ham.; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 124. 1929. p. p.

5a. 雅榕 (原变种) 图版 19: 5

Ficus concinna* Miq. var. *concinna

乔木, 高 15—20 米, 胸径 25—40 厘米; 树皮深灰色, 有皮孔; 小枝粗壮, 无毛。叶狭椭圆形, 长 5—10 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 全缘, 先端短尖至渐尖, 基部楔形, 两面光滑无毛, 下后灰绿色, 基生侧脉短, 侧脉 4—8 对, 小脉在表面明显; 叶柄短, 长约 1—2 厘米; 托叶披针形, 无毛, 长约 1 厘米。榕果成对腋生或 3—4 个簇生于无叶小枝叶腋, 球形, 直径 4—5 毫米; 雄花、瘿花、雌花同生于一榕果内壁; 雄花极少数, 生于榕果内壁近口部, 花被片 2, 披针形, 子房斜卵形, 花柱侧生, 柱头圆形; 瘿花相似于雌花, 花柱线形而短; 榕果无总梗或不超过 0.5 毫米。 花果期 3—6 月。

产广东、广西、贵州、云南 (北至双柏、玉溪、弥渡, 海拔 800—2000 米)。通常生于海拔 900—1600 米密林中或村寨附近。锡金、不丹、印度、中南半岛各国, 马来西亚、菲律宾、北加里曼丹也有。

5b. 近无柄雅榕 (新拟) (变种) 万年青 (硯山) 无柄小叶榕 (浙江植物志)

***Ficus concinna* Miq. var. *subsessilis* Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 376. 1959; in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 23. 1963; et in Gard. Bull. Sing. 21: 8. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 158. 1982; 浙江植物志 2: 87, f. 2—113. 1992. — *F. subpedunculata* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 3: 217, 286. 1867. — *Ficus microcarpa* auct. non L. f.; 中国高等植物图鉴 2: 483, quoad f. 966. 1982.**

本变种与原变种的主要区别在于, 没有总梗或有很短的总梗。叶无毛或被微柔毛。

产浙江南部 (北至龙泉、永嘉一线)、江西南部、广东、云南 (北至玉溪、广通、大理, 海拔 980—1600 (—2400) 米)。泰国西北部、印度东北部也有。

为紫胶虫寄主, 树冠大, 作庭荫树 (浙江植物志)。

系 3. 菩提树系 Ser. Religiosae Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 287. 1867. — *Urostigma* Gasp. ser. *Religiosa* Miq. Fl. Ind. Bat. 1, 2: 332. 1859.

榕果内壁无刚毛或具少数刚毛, 基生苞片宿存, 无总梗; 雄花生内壁近口部; 叶柄有关节。

我国有下列 2 种。

6. 菩提树 (植物名实图考引通志) 思维树 (群芳谱) 图版 19: 1—2