

15. 球果山榕 (新拟)

Ficus pubilimba Merr. in Journ. Arn. Arb. **23**: 159. 1942; Corner in Dansk Bot. Ark. **23** (1): 27. 1963; et in Gard. Bull. Sing. **21**: 15. 1965; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 61. 1994.

乔木, 高 10—15 米, 胸径约 15—25 厘米; 小枝直径 2—5 毫米, 鲜时绿色, 干后淡褐色, 无毛, 托叶脱落后不为环状痕。叶厚纸质, 短椭圆形至卵状椭圆形, 长 6—10 厘米, 宽 4—7 厘米, 表面深绿色, 背面灰绿色, 干后表面灰褐色, 背面红褐色, 先端钝尖, 基部近圆形, 全缘, 离基三出脉, 侧脉 5—6 对, 斜上至边缘网结向上, 在表面平, 背面明显; 叶柄长 2—3 厘米, 上面具沟槽, 无毛; 托叶卵状三角形, 外面无绢丝状毛。榕果球形, 直径 10—13 毫米, 表面平滑无毛, 顶部唇形, 微凸起, 基生苞片脱落后, 无环状疤痕; 雄花、雌花、瘿花同生于一榕果中; 雄花极少数, 花被片 4, 雄蕊 1 枚; 瘿花和雌花, 花被片 4, 披针形, 雌花无柄, 瘿花具梗, 花柱近顶生。花期初夏。

产广东、海南、福建。缅甸、泰国、越南、马来西亚有分布。

亚组 2. 大叶水榕亚组 Subsect. Dictyoneuron Corner in Gard. Bull. Sing. **17**: 373. 1959.

榕果有或无总梗, 基生苞片脱落或宿存; 雄花少数; 侧脉明显或不明显, 侧脉之间无小脉。

约 29 种, 产亚洲热带和亚热带; 我国有 4 种 2 变种, 分布于南部和西南部。

模式种: *F. sundaica* Bl.

系 1. 大叶水榕系 Ser. Glaberrimae Corner in Gard. Bull. Sing. **17**: 373. 1959.

榕果具总梗, 基生苞片早落。

仅有 1 种, 含 4 变种。我国产 1 种 1 变种。

16. 大叶水榕 (海南) 万年青 (河口), 池树 (景东)

Ficus glaberrima Bl. Bijdr. 451. 1825; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta **1**: 37. t. 43. 1888; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 506. 1890; Gagnep. in Lecomte, Gén. Indo-Chine **5**: 770. 1928; Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**: 216. 1935; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **17**: 73. 1936, p. p., excl. syn. *F. blinii*; Corner in Dansk Bot. Ark. **23** (1): 24. 1963; in Gard. Bull. Sing. **21**: 17. 1965; 海南植物志 **2**: 399. 1965; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 157, in clavi, 159, f. 8430. 1982; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **40** (2): 492. 1983; Griens. et Long, Fl. Bhutan **1** (1): 99. 1983; 西藏植物志 **1**: 515, f. 164. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 703. 1984; H. Koba et al., l. c. 211. 1994; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 59. 1994. —*Urostigma*