

乔木，幼时多附生，茎下部多分枝，高5—15米，树皮浅灰色，平滑；小枝绿色，无毛。叶厚革质，长椭圆形或倒卵状椭圆形，长10—16厘米，宽5—6厘米，表面深绿色，背面浅绿色，先端钝圆，基部楔形，全缘，基生侧脉短，侧脉8—12对，两面不明显，叶柄长1.5—2厘米，粗壮；托叶披针形或卵状披针形，长1—2厘米。榕果成对腋生，无总梗，球形至扁球形，直径1—1.5厘米，顶部平压，成熟时深红至紫红，内壁无刚毛，顶生苞片小而关闭，基生苞片3，广卵形，绿色，雄花有柄，花被片3，披针形，雄蕊1枚，瘦花有柄或无柄，花被片4，子房白色，花柱近顶生，长；雌花无柄。瘦果卵圆形，表面有瘤体和粘膜一层，花柱顶生，长与瘦果相等，柱头漏斗状。花果期9—11月。

产云南南部至西南部，贵州（见《中国高等植物图鉴》补编）。常生于海拔530—1350米，石灰岩山地或村寨附近，偶有栽培于庭园。尼泊尔、锡金、不丹、孟加拉国、缅甸、泰国、越南、印度西北部、马来西亚、印度尼西亚（苏门答腊）也有分布。

本种秋末冬初榕果成熟，极为美丽，是庭园优良的观赏树。

系2. 垂叶榕系 Ser. Benjamineae Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 218. 287. 1867.

叶薄革质，干后灰绿色至淡褐色，叶脉两面明显，基生侧脉不延长。

约3种，分布于亚洲热带、亚热带至澳大利亚。


我国有下列2种1变种。

21. 劲直榕 图版25: 4—6

*Ficus stricta* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 288. 1867; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 44. t. 53; 83 H 2. 1888; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 21. 1965; 云南种子植物名录，上册：709. 1984; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 63. 1994. —*Urostigma strictum* Miq. Pl. Jungh. 50. 1851.

乔木，高达15—20米；树皮灰色，平滑，小枝直立。叶薄革质，长圆形至广卵形，长4—12厘米，宽3—6厘米，两侧微不对称，全缘，先端渐尖或具短尖头，基部圆形至宽楔形，一级侧脉和二级侧脉难于区分，直达边缘，网结构成边脉；叶柄短，较粗壮；托叶披针形，膜质，长1.5—2.5厘米。榕果无总梗，成对或单生叶腋，球形至椭圆状球形，直径1.5—2厘米。光滑，成熟时黄色，顶部唇形，基生苞片3，宿存，广卵形，长3—10毫米，宽3—13毫米，明显；雄花极少数，无柄，花被片3，雄蕊1枚，花药心形，长于花丝；瘦花无柄或具柄，花被合生，上部4裂，子房光滑，花柱近侧生，短；雌花花被片4，花柱长。瘦果疏生瘤体。花果期5—8月。

产云南南部至西南部。海拔(350—)600—1500(—1800)米。印度（安达曼群岛）、越南、马来西亚、印度尼西亚（苏门答腊、爪哇、苏拉威西）、菲律宾（吕宋）有分布。



图版 25 1—3. 垂叶榕 *Ficus benjamina* Linn.: 1. 果枝, 2. 雄花, 3. 雌花。4—6. 劲直榕 *F. stricta* Miq.: 4. 果枝, 5. 榕果, 6. 雌花。7—8. 印度榕 *F. elastica* Roxb.: 7. 叶, 8. 果枝。 (张培英绘)