

雄花具梗，生于内壁近口部，花被片2，匙形，长短不一，雄蕊1枚；瘦花有梗或无梗，花被片3，延长，顶部渐尖，花柱侧生，较瘦果长2倍，柱头棒状。花期1—8月。

产台湾、福建、广东、海南、广西、云南、四川、贵州。海拔达到400—1600米。越南、缅甸、印度、斯里兰卡有分布。

26. 绿岛榕 (台湾)

Ficus pubinervis Bl. Bijdr. 1: 452. 1825; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 2: 733, f. 587. 1962; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 31. 112. 1965; 台湾植物志 2: 142. 1976 (*pubenervis*); Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. 31 (1): 7. 1983. — *F. cuneato-nervosa* Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Form. 1: 1. f. 1. 1925; Kanehira, Form. Trees, rev. ed.: 150 f. 96. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 1: 20. f. 21, 22, 31—1, 2. 1944.

灌木；小枝褐色，被微柔毛。叶倒卵椭圆形，长6—13厘米，宽2—6厘米，先端急尖，基部楔形，全缘，脉上被毛，脉腋内具腺体，侧脉5—7对；叶柄短，长约1厘米，被微柔毛；托叶线形，密被柔毛。榕果腋生，球形或扁球形，黄色或桔红色，基部缢缩成柄，被毛，总梗极短；雄花很少，具柄，生于榕果内壁近口部，花被片3—4，长于雄蕊，雄蕊1枚，花丝很短；瘦花具柄，花被片4—6，披针形，子房斜卵圆形，花柱侧生；雌花无柄，花被片与瘦花同数，线形，花柱侧生，长，柱头2裂，很长。花期3—4月，果期5—6月。

产我国台湾（台东、兰屿）。印度尼西亚（苏门答腊、爪哇、加里曼丹、苏拉威西、马鲁占群岛）、菲律宾也有。

亚属3. 聚果榕亚属 Subgen. *Sycomorus* (Gasp.) Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 228. 1867.

高大乔木；榕果生于老茎发出的瘤状短枝上，梨形；雌雄同株，花间无苞片，花被片红色或具白色边缘；雄花集中在榕果内壁近口部，无花柄，左右侧扁，雄蕊2，稀为1或3，花丝下部合生；雌花子房具红斑，柱头单1，花被常具撕裂状齿（雄花花被全缘）。多为茎花植物。

仅1种。产东非（埃塞俄比亚）、亚洲（西达阿拉伯）、澳大利亚。我国分布于南部和西南部。

27. 聚果榕 (云南种子植物名录) 马郎果 (贵州)

Ficus racemosa Linn. Sp. Pl. 1922. 1753; King in Ann. Gard. Bot. Calcutta 1: 173. t. 218. 1888; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 535. 1890; Corner in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 28. 1963; et in Gard. Bull. Sing. 21: 29. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 156. 1982, in clavi; Griers. et Long, Pl. Bhutan 1 (1): 93. 1983; 云南种子植物名录,

上册; 707. 1984; H. Koba et al., Name List. Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 212. 1994. —
F. glomerata Roxb. Corom. Pl. 2: 123. 1798; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 535. 1890;
 Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 807. 1928. — *Covellia glomerata* (Roxb.)
 Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 465. 1847.

27a. 聚果榕 (原变种) 图版 27: 5—9

var. *racemosa*

乔木, 高达 25—30 米, 胸径 60—90 厘米, 树皮灰褐色, 平滑, 幼枝嫩叶和果被平贴毛, 小枝褐色。叶薄革质, 椭圆状倒卵形至椭圆形或长椭圆形, 长 10—14 厘米, 宽 3.5—4.5 厘米, 先端渐尖或钝尖, 基部楔形或钝形, 全缘, 表面深绿色, 无毛, 背面浅绿色, 稍粗糙, 幼时被柔毛, 成长脱落, 基生叶脉三出, 侧脉 4—8 对; 叶柄长 2—3 厘米; 托叶卵状披针形, 膜质, 外面被微柔毛, 长 1.5—2 厘米。榕果聚生于老茎瘤状短枝上, 稀成对生于落叶枝叶腋, 梨形, 直径 2—2.5 厘米, 顶部脐状, 压平, 基部缢缩成柄, 基生苞片 3, 三角状卵形, 总梗长约 1 厘米; 雄花生于榕果内壁近口部, 无柄, 花被片 3—4, 雄蕊 2; 瘿花和雌花有柄, 花被线形, 先端有 3—4 齿, 花柱侧生, 柱头棒状。成熟榕果橙红色。 花期 5—7 月。

产广西南部 (龙津)、云南南部 (孟连、屏边、元阳、河口)、贵州 (南盘江一带)。喜生于潮湿地带, 常见于河畔、溪边, 偶见生长在溪沟中。印度、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、越南、泰国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚有分布。

本种榕果成熟味甜可食; 且为良好紫胶虫寄主树。

27b. 柔毛聚果榕 (变种)

Ficus racemosa Linn. var. *miquelli* (King) Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 34. 1965; 云南种子植物名录, 上册, 707, 1984; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 61. — *F. chittagonga* Miq. in Ann. Mus. Lugd.-Bat. 3: 288, 294. 1847, p, p. foliorum — *F. glomerata* Roxb. var. *miquelli* King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 173. 1887 — *F. glomerata* Roxb. var. *chittagonga* (Miq.) King l. c. t. 219 Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 807. 1928.

本变种与原变种主要区别在于幼枝、嫩叶、榕果密被白色柔毛。

产云南 (禄劝、开远、峨山、新平、南盘江、蒙自、西双版纳、元阳、河口等地)。生于海拔 (130—) 380—1700 米地区。印度、缅甸北部、越南北部也有。

亚属 4. 无花果亚属 Subgen. *Ficus*. — Subgen. *Eusyce* Miq. in Ann. Bot. Lugd.-Bat. 3: 289. 1867. — Subgen. *Carica* Mildbr. et Bur. in Engl's Bot. Jahrb. 46: 174. 1912.