

被片 4—5, 白色, 倒披针形, 被微毛, 雄蕊 4—3, 花药椭圆形; 瘿花生于雌花下部, 具柄, 花被片 5, 卵状披针形; 雌花生于另一植株榕果内壁, 子房卵圆形, 花柱侧生, 柱头 2 裂。榕果成熟橙红色; 瘦果卵圆形, 光滑, 背面龙骨状。花期 5—6 月, 果期 7—9 月。

产云南中部至东南部、四川西南部、贵州西南和东北部、广西、湖南、湖北西部 (巴东兴山以西)。常生于海拔 600—1300 (—1600) 米地区, 山地疏林中或溪沟潮湿处。越南北部也有。模式采自湖北西部。

榕果成熟可食。

30. 棒果榕 (中国高等植物图鉴)

Ficus subincisa Buch.-Ham. ex J. E. Sm. in Rees, Cyclop. 91. 1810; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1; 87. f. 111. 1888; Corner in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 30. 1963; et in Gard. Bull. Sing. 21; 36. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1; 156. 1982; Griens. et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 98. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 709. 1984; 横断山区维管植物, 上册: 308. 1993; H. Koba et al., Name List Fl. Pl. Gymnos. Nepal 212. 1994. — *F. clavata* Wall. Cat. no. 4495. 1831, nom. nud.; ex Miq. in Lond. Journ. Bot. 7; 431. 1848, descr.; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5; 20. 1888; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5; 784. 1928; C. Y. Wu et W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 6 (3): 279. 1957.

30a. 棒果榕 (原变种) 图版 28: 5—7

Ficus subincisa J. E. Sm. var. *subincisa*

灌木, 高 1—3 米; 树皮灰黑色, 光滑; 小枝纤细, 有薄翅, 红褐色。叶纸质, 倒卵状长圆形, 长 4—12 厘米, 宽 2—5 厘米, 先端骤尖为尾状, 基部楔形, 中部以上为波状疏钝锯齿, 两面有钟乳体, 侧脉 5—7 对, 斜上至边缘连结至顶部; 叶柄短, 长 4—6 毫米; 托叶线状披针形, 长约 5 毫米, 早落。榕果单生叶腋, 椭圆形至近球形, 直径 1.2—2.5 厘米, 光滑或有瘤体和皮孔, 顶生苞片脐状, 微突起, 基生苞片 3, 三角形; 总梗可达 10 毫米, 成熟榕果橙红色; 雄花和瘿花同生于一榕果内壁; 雄花生近口部, 具柄, 花被片 4, 雄蕊 1 枚; 瘿花子房光滑, 花柱侧生, 柱头短漏斗形; 雌花生于另一植株榕果内, 花柱侧生, 长, 柱头 2 裂; 瘦果透镜状, 光滑。花期 5—7 月, 果期 9—10 月。

产云南贡山、泸水、景东、蒙自一线以南地区, 常生于山谷, 沟边或疏林中。海拔 1000—2100 米。尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部 (阿萨姆)、缅甸、泰国、老挝、越南也有分布。

榕果成熟味甜可食。

30b. 细梗棒果榕 (变种) 图版 28: 8

Ficus subincisa Buch.-Ham. ex J. E. Sm. var. *paucidentata* (Miq.) Corner in Gard.