

Bull. Sing. 21: 36. 1965; 云南种子植物名录, 上册, 710. 1984; Nguyen T. Hiep in Tap Chi SINH HOC 16 (4): 63. 1994. — *F. trachycarpa* Miq. var. *paucidentata* Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 430. 1848. — *F. clavata* wall. ex Miq. 1. c. 431. — *F. caudata* Wall. Cat. 4494A, 1831, nom. nud.; ex Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 431. 1848, descr.; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 275. 1848. — *F. henryi* auct. non Warb. ex Diels; 西藏植物志 1: 515, f. 165, 3—4. 1983.

小灌木, 高 1—2 米。叶椭圆状披针形, 边缘锯齿稀少。榕果近球形, 直径 6—12 毫米, 光滑; 总梗长 2—4 毫米, 纤细。

产云南中部以西, 以南地区及西藏东南部。生于沟谷, 海拔 (480—) 1000—2400 米密林中。东喜马拉雅诸国、泰国东北部、越南北部也有。

系 3. 蔓榕系 Ser. *Podosyceae* (Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 418. 1959; in *ibid.* 21: 38. 1965. — *Ficus* Sect. *Podosycea* Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 442. 1848.

直立或匍匐灌木或为乔木; 雄花散生, 稀生于榕果内壁近口处, 花被片离生, 稀合生, 红色, 与雌花子房等长或短于子房; 叶背面有钟乳体。

约 34 种, 分布于热带亚洲 (包括马来西亚)。我国约 25 种, 主要分布西南部和华南。模式种: *F. pedunculosa* Miq.

亚系 1. 蔓榕亚系 Subser. *Podosyceae* Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 419. 1959; in *ibid.* 21: 38. 1965.

瘿花有柄或无柄; 花被片与无柄或略具柄的子房等长; 雌花花被片长于或短于子房。约 20 余种, 分布于喜马拉雅山区至中国, 东达日本及巴布亚新几内亚。

模式种: *F. pedunculosa* Miq.

31. 青藤公 (海南植物志) 尖尾榕 (中国高等植物图鉴)

Ficus langkokensis Drake in Morot Journ. de Bot. 10. 211. 1896; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 5: 824. 1929; Corner in Gard. Bull. Singapore 21: 48. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 154. 1982; 云南种子植物名录上册: 705. 1984 — *F. harmandii* Gagnep. in Lecomte Not. Syst. 4: 90. 1927; et in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 5: 771. 1928; Merr. et Chun in Sunyatsenia 1 (1): 52. 1930; 海南植物志 2: 398. 1965; 中国高等植物图鉴 1: 490. f. 979. 1972; — *F. tenuicaudata* W. Y. Chun ined.

乔木, 高 6—15 米, 树皮红褐色或灰黄色, 小枝细, 黄褐色, 被锈色糠屑状毛。叶互生, 纸质, 椭圆状披针形至椭圆形, 长 7—19 厘米, 宽 2—6 厘米, 顶端尾状渐尖, 基

部阔楔形，全缘，两面无毛，叶背红褐色，叶基三出脉，基出侧脉达叶的三分之一至二分之一，侧脉2—4对，背面凸起，网脉在叶背稍明显；叶柄长1—4厘米，无毛或疏被柔毛；托叶披针形，长7—10毫米。榕果成对或单生于叶腋，球形，径5—12毫米，被锈色糠屑状毛，顶端具脐状凸起，基生苞片3，阔卵形，总梗较细，长5—15毫米，被锈色糠屑状毛。雄花具柄，被片3—4枚，卵形，雄蕊1—2个，花丝短；雌花花被片4枚，倒卵形，暗红色，花柱侧生。

产福建、广东、广西、海南、四川和云南（南部至东南部）。生海拔150—2000米山谷林中或沟边。印度东北部（阿萨姆）、老挝、越南（中部以北）也有分布。

32. 蔓榕（台湾植物志）

Ficus pedunculosa Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 442. f. 7A. 1848; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 2: 731. f. 585. 1962; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 39. 1965; 台湾植物志 2: 140. 1976; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. & Taxon. 30 (1): 11. 1983, excl. syn. — *F. luzonensis* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 3: 4000. 1904. — *F. pedunculosa* Miq. var. *glabrifolia* Chang in Quart. Journ. Taiwan For. 3 (2): 12. 1967.

32a. 蔓榕（原变种）

Ficus pedunculosa Miq. var. *pedunculosa*

常绿灌木，通常匍匐爬行于石灰岩上，茎淡红褐色；小枝薄被柔毛和糠秕状鳞毛。叶革质，无毛或被硬毛，椭圆形或倒卵状椭圆形，长4—10厘米，宽3—6厘米，先端急尖，基部楔形，表面无毛或具糙毛，基部侧生2脉延长，侧脉4—6对，在背面隆起；叶柄长1.5厘米，被鳞片；托叶宽披针形，膜质，长1—1.5厘米，早落。榕果单生或成对腋生，近球形至倒卵圆形，直径1—2厘米，表面被微柔毛，基生苞片3，膜质，总花梗纤细，略被柔毛，长2—3厘米；雄花具长梗，基部有2苞片，花被片2—4，雄蕊2—4枚，花丝短，花药椭圆形，2室；瘿花具梗或近无梗，花被片3—5，子房斜卵圆形，表面光滑，有短梗，花柱侧生，短而厚，柱头膨大或为截形；雌花无梗，花被片3—5，短，子房光滑，花柱较瘿花花柱长，柱头浅漏斗形。花果期3—6月。

产我国台湾（台东、恒春半岛和兰屿）。菲律宾、印度尼西亚（苏拉威西、马鲁古群岛）、巴布亚新几内亚也有。在我国台湾只产于沿海岛屿。

32b. 鹅銮鼻蔓榕（变种）（台湾植物志）

Ficus pedunculosa Miq. var. *mearnsii* (Merr.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 426. 1960, et in ibid. 21: 40. 1965; 台湾植物志 2: 142. pl. 241. 1976. — *F. mearnsii* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 3: 402. 1908. — *F. garanbiensis* Hayata, Icon. Pl. Form. 8: 118. f. 42. 1918; Kanehira, Form. Trees rev. ed.: 153, f. 100. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp.: 35, 1944.