

叶倒卵形，先端圆钝，边缘有宽边，基生侧脉延长至叶片1/2—2/3处。

产我国台湾（台东、屏东）。菲律宾（吕宋）也有。

33. 森林榕（西藏植物名录） 阿比（贡山，独龙族语）

*Ficus nerilifolia* J. E. Sm. in Rees, Cyclop. 14: 21. 1810; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 426. 1960; 中国高等植物图鉴补编 1: 152. 1982. in clavi; Griens. et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 95. 1983; 西藏植物志 1: 515. 1983; 云南种子植物名录，上册: 706. 1984; 横断山区维管植物，上册: 307. 1993; H. Koba et al., Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 212. 1994; — *F. gemella* Wall. ex Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 454. 1848. — *F. nemoralis* Wall. ex Miq. var. *gemella* (Wall.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (2): 162. Pl. 206. 1888. — *F. wardii* C. E. C. Fischer in Kew Bull. no. 4: 281, 1936.

33a. 森森榕（原变种） 图版 29: 1—4

*Ficus neriifolia* J. E. Sm. var. *neriifolia*

小乔木，高达15米，树皮深灰色，平滑；小枝绿色至浅绿色；叶迹和托叶环痕明显。叶薄革质，无毛，椭圆形至卵状椭圆形，两侧微不相等，长8—18厘米，宽3—6.5厘米，全缘，两面绿色，表面光滑，背面密生点状钟乳体，先端渐尖为尾状，基部楔形至圆形，基生侧脉极短，侧脉7—15对，与主脉略成直角，至边缘连结向上，网脉网结与侧脉平行；叶柄长1—4厘米；托叶披针形，无毛。榕果成对腋生或生于落叶小枝叶腋，球形，直径8—10毫米，无总梗，果皮厚，内壁无刚毛，石细胞丰富，顶部脐状，基生苞片3，卵圆形，近基部合生；雄花具柄，多数，花被片3—4，卵状披针形，雄蕊2—3枚；瘦花少数，子房卵圆形，花柱短，近侧生；雌花及中性花，花被片3—4，子房球形，花柱细长。瘦果光滑。 花果期10月至翌年4月。

产西藏东南部（墨脱、察隅）及云南（漾濞、景东、龙陵、腾冲、福贡、贡山）。生于海拔（1200—）1700—2500米平原、山谷、山坡阔叶林中。尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部（阿萨姆）也有。

33b. 薄果森林榕（变种）（西藏植物名录） 图版 29: 5—6

*Ficus neriifolia* J. E. Sm. var. *fieldingii* (Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 426. 1960, in ibid. 21: 39. 1965; 西藏植物志 1: 515. 1983; 云南种子植物名录，上册: 706. 1984; H. Koba et al. l. c. 212. 1994. — *F. fieldingii* Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 439. 1848. — *F. nemoralis* Wall. var. *fieldingii* (Miq.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (2): 163. 1888.

榕果卵圆形，直径8—10毫米，果皮薄，无石细胞，总梗极短，叶椭圆状卵形，基部狭楔形。