

产云南西部、西南部等地，海拔(1400—)1550—2450(—3200)米。尼泊尔、锡金、印度东北部(阿萨姆)、缅甸也有。

33c. 薄叶森林榕 (变种) (西藏植物名录) 图版 29: 8

*Ficus neriifolia* J. E. Sm. var. *nemoralis* (Wall. ex Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 426. 1960, in *ibid.* 21: 39, 1965; 西藏植物志. 1: 515. 1983, 云南种子植物名录, 上册: 706. 1984; H. Koba et al., l. c. 212. 1984. — *F. nemoralis* Wall. ex Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 453. 1848.

榕果近球形，果皮厚，有或无石细胞；总梗长4—6毫米。

产云南西南部(凤庆)及西藏东南部，海拔在1500米以上至2350米阔叶林中。尼泊尔、锡金、印度东北部有分布。

33d. 棒果森林榕 (变种) (西藏植物名录) 图版 29: 7

*Ficus neriifolia* J. E. Sm. var. *trilepis* (Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 426. 1960, in *ibid.* 21: 39, 1965; 西藏植物志. 1: 515. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 706. 1984. — *F. trilepis* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 228, 294. 1867. — *F. nemoralis* Wall. ex Miq. var. *trilepis* (Miq.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (2): 162. 1888.

榕果圆柱状棒形，长10—12毫米，具总梗；叶卵状披针形。

产云南南部(景东、西双版纳)、西部(腾冲、德宏自治州)，西藏东南部(墨脱)，海拔1700—2500(—2900)米阔叶林中。锡金、印度东北部(阿萨姆)、缅甸有分布。

34. 扶绥榕 (广西植物) 图版 30: 4—6

*Ficus fusuiensis* S. S. Chang in Guihaia 3 (4): 298, f. 3. 1983.


灌木，高约2米；小枝纤细，幼枝及叶柄微被毛。叶干后灰绿色，倒披针形或长圆状披针形，长5.5—15厘米，宽4—4.5厘米，先端渐尖或为尾状，尾长5—10毫米，基部楔形或微钝，全缘，两面无毛或疏被柔毛，背面和边缘被钩状刺毛，侧脉6—10对，基生叶脉很短；叶柄长3—7毫米，散生短柔毛；托叶膜质，披针形。榕果单生或成对腋生，圆锥状椭圆形，长1—1.2厘米，直径0.8—1厘米，下部收缩为短柄，无石细胞，口部苞片直立，红色，基生苞片三，卵状三角形，总梗长5毫米；雄花生于榕果近口部或散生，具柄，花被片4，倒披形，雄蕊2；瘦花极多数，生于雄花之下，具梗，花被片4，卵状披针形，子房近球形，具短柄，花柱侧生，短，柱头漏斗状。果期6月。

产广西扶绥县(模式标本产地)，生于海拔300米水边、山谷阴处或林中。

35. 乳源榕 (植物分类学报) 图版 30: 1—3

*Ficus ruyuanensis* S. S. Chang in Acta Phytotax. Sin. 20 (1): 97. 1983. — *F. daimiaoshanensis* S. S. Chang in Guihaia 4 (2): 121, f. 14. 1984. syn. nov.

灌木或乔木，高约1—2米；小枝纤细，节短，新枝和叶柄密生直立开展的糙毛。叶



图版 29 1—4. 森林榕 *Ficus nerifolia* J. E. Sm. var. *nerifolia*; 1. 叶, 2. 榕果, 3. 瘿花, 4. 雄花。5—6. 薄果森林榕 *F. nerifolia* J. E. Sm. var. *fieldingii* (Miq.) Corner; 5. 果枝, 6. 瘿花。7. 棒果森林榕 *F. nerifolia* J. E. Sm. var. *trilepis* (King) Corner; 榕果。8. 薄叶森林榕 *F. nerifolia* J. E. Sm. var. *nemoralis* (Wall. ex Miq.) Corner; 果枝。 (张培英绘)