

Yamazaki in Journ. Phytogeogr. Taxon. **31** (1): 12. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 703. 1984; 浙江植物志 **2**: 93, f. 2-123. 1992; 湖北植物大全: 267. 1992; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 58. 1994. — *F. beecheyana* Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 271. 1841; Hand. Mazz. Symb. Sin. **7**: 1929; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 149. f. 95. 1936; Sata Monogr. Ficus Form. and Philipp. **33**, f. 11, 12. 1944, et in Journ. Soc. Trop. Agr. **6**: 22. 1944; 中国高等植物图鉴 **1**: 490, f. 988. 1972.

落叶小乔木或灌木, 高2—7米; 树皮灰褐色, 小枝密生硬毛。叶厚纸质, 倒卵状椭圆形, 长7—20厘米, 宽3—9厘米, 先端短渐尖, 基部圆形至浅心形, 全缘或上部偶有疏齿, 表面较粗糙, 疏生柔毛, 背面被柔毛, 侧脉5—7对, 弯拱向上, 基生脉延长; 叶柄长1—4厘米, 纤细, 密被灰白色短硬毛。托叶三角状披针形, 膜质, 早落。榕果单生叶腋, 具总梗, 球形或梨形, 直径1.2—2厘米, 幼时被柔毛和短粗毛, 顶生苞片脐状, 基生苞片3, 卵状三角形, 成熟时黄红至紫黑色; 雄花和瘦花生于同一榕果内壁, 雌花生于另一植株的榕果中; 雄花有柄或近无柄, 花被片3或2—4, 椭圆形至卵状披针形, 雄蕊2—3枚; 瘦花近无柄或有短柄, 花被片3—5, 披针形, 长于子房, 被毛, 子房椭圆状球形, 花柱侧生, 短, 柱头2裂; 雌花花被片4—6, 宽匙形, 子房光滑有短柄, 花柱侧生, 柱头2裂。 花果期5—6月。

产广东 (及沿海岛屿)、广西、贵州、湖北 (武汉、十堰)、湖南、江西、福建、浙江、台湾。生于山坡林下或溪边。日本 (琉球)、越南也有分布。

茎皮纤维可供造纸。

36c. 狭叶天仙果 (变型) 狭叶鹿饭 (台湾)

Ficus erecta Thunb. var. *beecheyana* f. *koshunensis* (Hayata) Corner in Gard. Bull. Sing. **17**: 427. 1960, in ibid. **21**: 41. 1965. — *F. koshunensis* Hayata in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo. **30**: 276. 1911. — *F. beecheyana* Hook. et Arn. var. *koshunensis* (Hayata) Sata in Journ. Soc. Trop. Agr. **6**: 22. 1934, et f. 'tenuifolium' Sata, l. c. — *Ficus beecheyana* (Hook. et Arn.) King f. *koshunensis* (Hayata) Corner in Gard. Bull. Sing. **17**: 427. 1959.

叶长圆状披针形, 表面粗糙, 被白色粗长柔毛。榕果近球形, 被白色长柔毛, 直径1—1.2厘米, 顶生苞片红色, 基部缢缩为柄; 果梗长1—1.5厘米。

产台湾、安徽、江西、贵州 (雷山、榕江900—980米)、广西 (龙津300—480米)、云南 (思茅、金平、临沧, 海拔1300—1600米)。

本变型在台湾植物志 (2: 132. 1976) 中并入 *Ficus erecta* Thunb. ex Kaempfer var. *beecheyana* (Hook. et Arn.) King 中。

37. 舶梨榕 (海南植物志) 梨状牛奶子 (广东)