

产云南(富民、峨山、金平、砚山)及四川米易。生于海拔1700—2100米的路边、沟谷林中。缅甸、越南北部有分布。

横断山区维管植物将本种的分布区扩大至漾濞、泸水、贡山、攀枝花、洱源等处,是否误定待考;有可能是 *Ficus gasparriniana* Miq. var. *viridescens* (Lévl. et Van.) Corner

41. 线尾榕(新拟)

Ficus filicauda Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 99. 1929; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 39. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 158, 1982, in clavi; 西藏植物志 1: 517, 1983; 云南种子植物名录, 上册: 702. 1984. ——*F. xiphias* C. E. C. Fischer, in Kew Bull. 1936, 282.

41a. 线尾榕(原变种) 图版 31: 1—3

Ficus filicauda Hand.-Mazz. var. *filicauda*

乔木, 高7—10米; 幼枝纤细, 被疏柔毛; 冬芽纺锤形, 长约7毫米, 被柔毛。叶披针状长椭圆形, 长10—14厘米, 宽2.5—3.5厘米, 全缘, 先端急尖延长为线形尾状, 尾长约4厘米; 表面无毛, 背面中脉及侧脉疏生柔毛, 中脉两面凸起, 基生侧脉短, 侧脉9—12对, 与中脉近成直角展出至边缘网结向上, 侧脉和网脉在叶背面较明显; 叶柄长7—10毫米, 被毛; 托叶披针形, 长1—1.5厘米, 膜质。榕果单生或成对腋生, 椭圆状球形, 直径约1厘米, 表面无毛, 有稀疏白点, 顶部微呈脐状, 基生苞片3, 广卵形, 边缘膜质, 总梗长4—5毫米; 雄花生榕果内壁近口部, 花被片4, 倒卵形, 无毛, 雄蕊2, 花药椭圆形, 花丝短, 花柄长约2毫米; 瘿花生内壁中下部, 花被片4, 子房近球形, 具柄, 花柱侧生, 短, 柱头2深裂。

产云南(独龙江至泸水)、西藏(波密、墨脱), 生于海拔2000—2700米林中。缅甸北部、印度东北部也有。

41b. 长柄线尾榕(西藏植物志) 图版 31: 4

Ficus filicauda Hand. Mazz. var. *longipes* S. S. Chang 西藏植物志 1: 517. f. 167. 1983.

叶光滑无毛, 先端尾长2厘米。榕果球形, 总梗长2厘米。

产西藏(墨脱, 模式标本产地), 海拔1900—2000米地区。

42. 冠毛榕(新拟)

Ficus gasparriniana Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 436. 1848; Corner in Gard. Bull. Sing 17: 428. 1959, in ibid. 21: 41. 1965; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16(4): 59. 1994. ——*F. silhetensis* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 223. 1867; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 154. t. 194. 1888; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 533. 1890; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 788. 1928; Grier. et Long,