

产云南、广西、贵州南部及西南部。生于溪边或河岸旁。越南、老挝、泰国也有。模式标本采自贵州（无明确地点）。

### 51. 琴叶榕（海南植物志）

*Ficus pandurata* Hance in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 18: 229, 1862; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 141. t. 177b. 1888; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 465. 1899; Gagnep. in Lecomte. Fl. Gén. Indo-Chine 5: 790. 1928; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 48: 297. 1931; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 42. 1965; 海南植物志 2: 400. 1965; 浙江植物志 2: 92, f. 2—120. 1992; 湖北植物大全: 269. 1992; 中国高等植物图鉴 1: 494. f. 987. 1972, 中国高等植物图鉴补编 1: 156. 1982, in clavi; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 61. 1994.

#### 51a. 琴叶榕（原变种） 图版 32: 6—8

##### *Ficus pandurata* Hance var. *pandurata*

小灌木，高1—2米；小枝。嫩叶幼时被白色柔毛。叶纸质，提琴形或倒卵形，长4—8厘米，先端急尖有短尖，基部圆形至宽楔形，中部缢缩，表面无毛，背面叶脉有疏毛和小瘤点，基生侧脉2，侧脉3—5对；叶柄疏被糙毛，长3—5毫米；托叶披针形，迟落。榕果单生叶腋，鲜红色，椭圆形或球形，直径6—10毫米，顶部脐状突起，基生苞片3，卵形，总梗长4—5毫米，纤细，雄花有柄，生榕果内壁口部，花被片4，线形，雄蕊3，稀为2，长短不一；瘿花有柄或无柄，花被片3—4，倒披针形至线形，子房近球形，花柱侧生，很短；雌花花被片3—4，椭圆形，花柱侧生，细长，柱头漏斗形。花期6—8月。

产广东、海南、广西、福建、湖南、湖北、江西、安徽（南部）、浙江。生于山地，旷野或灌丛林下。越南也有分布。云南种子植物名录根据Forrest 8354的记录，显系误定。

#### 51b. 全缘琴叶榕（变种） 全叶榕（中国高等植物图鉴补编） 图版 32: 9

*Ficus pandurata* Hance var. *holophylla* Migo in Bull. Shanghai. Inst. 14: 329. 1944; 中国高等植物图鉴补编 1: 155. 1982, in clavi; 浙江植物志 2: 93, f. 2—121. 1992.

本变种叶倒卵状披针形或披针形，先端渐尖，中部不收缢；榕果椭圆形，直径4—6毫米，顶部微脐状。花果期同上。

我国东南部各省常见，广东、广西偶见并向 var. *pandurata* 过渡。

#### 51c. 条叶榕（中国高等植物图鉴补编）

*Ficus pandurata* Hance var. *angustifolia* Cheng in Contr. Soc. Lob. Sci. Bot. 9: 256. 1934, p. p. max.; 中国高等植物图鉴补编 1: 155. 1982, in clavi; 浙江植物志 2: 95, f. 2—122. 1992; 湖北植物大全 267. 1992. — *F. pandurata* Hance var. *linearis* Migo in Journ. Shanghai Sci. Inst. 14: 330. 1944. syn. nov. — *F. formosana* Maxim. var. *angustissima* Ko in Acta Phytotax. Sin. 8: 352. 1963. syn. nov.; 海南植物志 2: 397. 1965.