

系 2. 杂色榕系 Ser. *Variegatae* Corner in Gard. Bull. Sing. **18**: 33. 1960, in ibid. **21**: 82. 1965.

榕果较小, 表面无红晕, 顶生苞片不为莲座状; 花被片绿色或微红, 子房红褐至淡褐色。我国有下列 1 种, 2 变种。

66. 杂色榕 (海南植物志)

Ficus variegata Bl. Bijdr. **2**: 459. 1825; Miq. Ind. Bat. **1—2**: 320. 1859; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. **3**: 295. 1867; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 808. 1928; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 366. 1944; Corner in Gard. Bull. Sing. **21**: 82. 1965; 海南植物志 **2**: 388. 1965; Hatusima, Fl. Ryukyus. : 228. 1971; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. **31** (1): 11. 1983, p. p., syn. excl.; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 64. 1994. — *F. laevigata* Bl. Philipp. Bot. **2**: 549. 1904. — *F. variegata* Bl. f. *rotundata* Sata, l. c. 367.

66a. 杂色榕 (原变种)

Ficus variegata Bl. var. *variegata*

乔木, 高 7—10 米, 树皮灰褐色, 平滑, 胸径 10—15 (—17) 厘米, 幼枝绿色, 微被柔毛。叶互生, 厚纸质, 广卵形至卵状椭圆形, 长 10—17 厘米, 顶端渐尖或钝, 基部圆形至浅心形, 边缘波状或具浅疏锯齿; 幼叶背面被柔毛, 基生叶脉 5 条, 近基部的 2 条细小, 侧脉 4—6 对; 叶柄长 2.5—6 厘米, 托叶卵状披针形, 无毛, 长 1—1.5 厘米。榕果簇生于老茎发出的瘤状短枝上, 球形, 直径 2.5—3 厘米, 顶部微压扁, 顶生苞片卵圆形, 脐状微凸起, 基生苞片 3, 早落, 残存环状疤痕, 成熟榕果红色, 有绿色条纹和斑点; 总梗长 2—4 厘米; 雄花生榕果内壁口部, 花被片 3—4, 宽卵形, 雄蕊 2, 花丝基部合生成一柄; 瘦花生内壁近口部, 花被合生, 管状, 顶端 4—5 齿裂, 包围子房, 花柱侧生, 短, 柱头漏斗形; 雌花生于雌植株榕果内壁, 花被片 3—4, 条状披针形, 薄膜质, 基部合生。瘦果倒卵形, 薄被瘤体, 花柱与瘦果等长, 柱头棒状, 无毛。花期冬季。

印度 (包括南安达曼岛)、缅甸、越南、马来西亚、所罗门群岛和澳大利亚均有分布。中国不产。

66b. 青果榕 (变种) 图版 43: 6—7

Ficus variegata Bl. var. *chlorocarpa* (Benth.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta **1**: 170. 1888; Corner in Gard. Bull. Sing. **21**: 83. 1965; 海南植物志 **2**: 388. 1965; 中国高等植物图鉴补编, **1**: 154. 1982, in clavi; — *F. chlorocarpa* Benth. Fl. Hongk. **330**. 1861.

大树, 高达 15 米, 树皮灰色。叶全缘; 叶柄长 5—6.8 厘米, 榕果基部收缩成短柄, 成熟时绿色至黄色。花被合生。花果期春季至秋季。