

产广东及沿海岛屿、海南、广西、云南南部。低海拔，沟谷地区常见。越南中部、泰国也有分布。

果熟时可食用。

66c. 幹花榕 (变种) (台湾植物志)

*Ficus variegata* Bl. var. *garciae* (Elm.) Corner in Gard. Bull. Sing. 18. 33. 1960, in ibid. 21: 83. 1965; 台湾植物志 2: 154. 1976. — *F. garciae* Elm. Leaf. Philipp. Bot. 2550. 1908; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 2: 723, f. 577. 1962. — *F. konishii* Hayata in Journ. Coll. Sci. 30: 223. 1911 (Mater. Fl. Formos. 273); Kanehira, Form. Trees rev. ed. 156. t. 103. 1936.

与原变种的区别，侧脉 7—14 对，基生侧脉不延长，叶先急尖或骤尖。榕果扁球形，直径 2—3.5 厘米，成熟时绿色，有白斑；总梗纤细。花期春夏，果期夏秋。

产我国台湾。常生于中低海拔沿海岛屿。日本琉球、菲律宾、印度尼西亚（苏拉威西）也有。

组 3. 岩木瓜组 Sect. *Sinosycidium* Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 24. 1959.

灌木或为乔木，托叶分生；雄花生于榕果内壁近口部，无柄或具柄，花被白色至肉色，膜质，雄蕊 2，花药无短尖头，子房白色，柱头浅 2 裂，瘦果短长圆形，微具龙骨，光滑；榕果有侧生苞片；叶背面密生锈色或黑色糙毛；老茎生花。

1 种，我国特产。

67. 岩木瓜 (屏边) 阿巴果 (双柏) 图版 44: 1—3

*Ficus tsiangii* Merr. ex Corner in Gard. Bull. Sing. 18: 25. 1960; in ibid. 21: 62. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 164, f. 8438. 1982 (“*F. tsangii*” in clavi et index); 云南种子植物名录, 上册: 710. 1984; 湖北植物大全: 268. 1992.

灌木或乔木，高 4—6 米，树皮灰褐色，粗糙，分枝稀疏，小枝节间长，直径约 3—4 毫米，密生灰白色至黄褐色硬毛。叶螺旋状排列，纸质，卵形至倒卵椭圆形，长 8—23 厘米，宽 5—15 厘米，先端稍宽，渐尖为尾状；尾长 7—13 毫米，基部圆形至浅心形或宽楔形，表面很粗糙，被粗糙硬毛，背面有钟乳体，密被灰白色或褐色糙毛，基生侧脉延伸至叶片中部以上，侧脉每边 4—5 条，叶基有 2 腺体；叶柄细长，3—12 厘米；托叶早落，披针形，长约 5—6 毫米，被贴伏柔毛。榕果簇生于老茎基部或落叶瘤状短枝上，卵圆形至球状椭圆形，长 2—3.5 厘米，宽 1.5—2 厘米，被粗糙短硬毛，成熟红色，表面有侧生苞片，顶生苞片直立，总梗长 2—4 厘米，榕果内壁有刚毛；雄花两型，生内壁口部或散生，无柄雄花生于口部；有柄雄花散生，花被片 3—5 枚，线状披针形，雄蕊 2，稀为 1，花丝基部有毛，花药无短尖；雌花；子房无柄，柱头浅 2 裂；散生刚毛；不育花小。瘦果透镜状，背面微具龙骨。花期 5—8 月。