

小乔木，高3—10米，胸径15—25厘米，树皮灰色，平滑，树冠平展，伞状；幼枝被白色或褐色柔毛。叶排为两列，长圆状披针形，长18—28厘米，宽9—11厘米，纸质，先端渐尖，基部偏心形，一侧耳状，边缘有细锯齿或全缘，表面粗糙，脉上被硬毛，背面密生短硬毛和黄褐色小突点，基生侧脉较短，侧脉10—14对，耳状叶脉侧生，3—4条；叶柄长5—10毫米，粗壮，密被硬毛；托叶披针形，长2—3.5厘米，膜质，近无毛，红色。榕果生于老茎发出的无叶小枝上，果枝下垂至根部或穿入土中；榕果球形，直径1—1.5厘米，被短硬毛，有侧生苞片，基生苞片3，被毛，总梗长5—10毫米，被硬毛，成熟榕果紫红色；雄花，生于榕果内壁近口部，花被片3枚，红色，倒披针形，长于雄蕊，雄蕊2稀为1，花药白色，花丝短；瘦花，花被片线状披针形，4—5枚，花柱侧生，短；雌花花被片与瘦花同，基部有苞片1枚，子房卵状椭圆形，花柱侧生，长，柱头圆柱形，浅2裂。瘦果宽卵形，顶端一侧微缺，微具瘤体。花期5—10月。

产广西、贵州、云南[420—1860(—2800)米]、西藏(墨脱)。常生于路旁，林缘或沟谷。马来西亚(雪兰莪以北)、越南、泰国、缅甸、不丹、锡金、尼泊尔、印度中部也有。

本种树冠伞状，叶排为两列，冠幅平行展出，为蔽荫良好树种。

72. 平枝榕 (新拟) 葡萄榕

Ficus prostrata Wall. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 297. 1867; King in Ann. Gard. Bot. Calcutta 1: 105. t. 135. 1888; Corner in Gard. Bull. 21: 63. 1965; Griens. et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 93. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 707. 1984; 横断山区维管植物, 上册: 305. 1993. Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 61. 1994. — *Covellia prostrata* Miq. in Lond. Journ. Bot. 7: 465. 1848.

小乔木，叶薄纸质，互生，倒披针形至长圆形，长8—11厘米，边缘全缘，先端长渐尖，基部楔形至微钝，多少不对称，表面平滑，基生侧脉很短，侧脉每边8—10条；叶柄长约1.5—3厘米；托叶膜质，披针形，长约2厘米。榕果近梨形，单生于下垂无叶具鳞片弯曲的小枝节上，表面有瘤状凸体及侧生苞片，基生苞片3，卵形，先端为不规则渐尖，总梗长约8—10毫米；雄花，雄蕊1稀为2，花被片3—4，线形，子房宽卵形或近菱形，瘦果斜卵形，花柱侧生，柱头线形。有记载，未见标本。

产云南(独龙江)海拔1200米左右密林中。越南北部、印度东北部(阿萨姆)、锡金有分布。

亚组2. 山榕亚组 Subsect. *Varinga* (Miq.) Corner — *Ficus* Sect. *Carica* Miq. Subsect. *Varinga* Miq. in Ann. Sci. Nat. ser. 3 (1): 33. 1844.

相近于糙叶榕亚组 (Subsect. *Sycidum*)，但瘦果短长圆形，花被片和子房白色；乔木或灌木，稀匍匐状，无附生者。

约 13 种，分布于非洲、亚洲。我国有下列 3 种。

系 1. 山榕系 Ser. *Heterophylleae* Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 446. 1959.

榕果单生叶腋，球形至梨形，表面被瘤状体和粗毛，无侧生苞片；花被片小，光滑；瘦果光滑；幼植物叶常羽状分裂，叶近对称。

我国有下列 1 种。

73. 山榕 (海南) 羊乳子 (海南) 图版 45: 1—3 奇叶榕 (云南种子植物名录)

Ficus heterophylla Linn. f. Suppl. 442. 1781; Roxb. Fl. Ind. 3: 531. 1832; King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 75. t. 94. 1888; Corner in Gard. Bull. Sing. 21: 73. 1965; 海南植物志 2: 396. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 149. 1982, in clavi; Griers. et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 92. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 703. 1984; Koba et al., Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 211. 1994. — *F. scabrella* Roxb. Fl. Ind. 3: 531. 1832. — *F. heterophylla* Linn. f. var. *scabrella* (Roxb.) King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 75. 1888.

灌木或为匍匐状植物；枝被短柔毛。叶互生，纸质，叶型变异大，幼植物通常羽裂，卵状披针形或为卵状椭圆形，长 7—10 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端微渐尖，基部钝，圆形或心形，边缘具粗齿，分裂或不分裂，两面粗糙，被短硬毛，侧脉 4—8 条；叶柄长 7—10 毫米；托叶成对，近卵形，膜质。榕果单生叶腋或落叶枝上，球形至梨形，直径 1—2 厘米，被粗毛和小瘤体，成熟橙黄色，平滑，顶端脐状凸起，基部收狭成短柄，基生苞片细小，三角形，总梗长 4—6 毫米，被毛；雄花，具柄，生榕果内壁近口部，花被 3—4 深裂，雄蕊 1 枚；瘿花具柄，花被片与雄花相同，子房卵圆形，花柱侧生，短，柱头粗大；雌花，生于另一植株榕果内壁，具柄，花被片 4，白色。瘦果短椭圆形，表面被透明薄膜，花柱侧生，长，柱头圆柱形。花期 7—11 月。

产海南和云南 (西双版纳)。多生于中海拔山谷或溪边潮湿地带。斯里兰卡、印度、缅甸、泰国、中南半岛各国，马来西亚、印度尼西亚 (爪哇)、加里曼丹等地也有分布。

系 2. 歪叶榕系 Ser. *Cyrtophylleae* Corner in Gard. Bull. Sing 17: 446. 1959.

榕果成对腋生或成簇生于茎上，有总梗，侧生苞片散生；瘦果光滑；叶极不对称，粗糙被毛。

我国有下列 2 种。

74. 歪叶榕 (高等植物图鉴) 图版 44: 8—10 不对称榕 (云南种子植物名录)

Ficus cyrtophylla Wall. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 282. 1867; King. in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 82. 1888; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 473.