

花被片4, 膜质, 倒卵形; 瘦花具柄, 花被片4, 披针形, 子房光滑, 花柱短; 雌花花被片匙形, 长于子房, 子房白色。瘦果短。长圆形, 光滑, 花柱近侧生。

产云南(蒙自、河口、屏边、金平、元阳、西双版纳)。生于海拔350—1200米的山地或沟谷林中。印度北部、印度尼西亚(苏门答腊)也有。

亚组3. 斜叶榕亚组 Subsect. *Palaeomorphe* (King) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 446. 1959. — *Ficus* Sect. *Palaeomorphe* King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (1): 3. 1887. — Subgen. *Palaeomorphe* (King) Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 217. 1944.

瘦果长圆形, 顶部有龙骨或棱, 光滑; 雄花通常有退化子房; 叶排为两列, 叶柄短; 榕果有或无总梗, 钟乳体乳头状。乔木、灌木、匍匐、附生。

约19种, 分布亚洲、澳大利亚。我国约4种, 分布华南、西南、台湾。

系1. 斜叶榕系 Ser. *Pallidae* Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 433. 1848; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 447. 1959 — Ser. *Euglabrifoliae* Sata Monogr. Ficus Form. and Philipp. 217, 218, 377. 1944.

中型乔木或大树, 通常附生; 托叶钻形, 直而硬; 叶革质, 两面有钟乳体; 榕果无侧生苞片。

#### 76. 斜叶榕

*Ficus tinctoria* Forst. f. Prodr. Fl. Ins. Austral. Prodr. 76. 1786; Kanehira, Fl. Micron. 91. f. 20. 1, 1933; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 475. 1959, in ibid. 21: 74. 1965; Li, Woody Fl. Taiwan 126. 1963; Stone in Micronesia 6: 251. 1970; 台湾植物志 2: 152. 1976; Yumazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. 31 (1): 14. 1983; H. Koba et al., Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 213. 1994.

##### 76a. 斜叶榕 (原亚种)

*Ficus tinctoria* Forst. f. subsp. *tinctoria*

小乔木, 幼时多附生, 树皮微粗糙, 小枝褐色。叶薄革质, 排为两列, 椭圆形至卵状椭圆形, 长8—13厘米, 宽4—6厘米, 顶端钝或急尖, 基部宽楔形, 全缘, 一侧稍宽, 两面无毛, 背面略粗糙, 网脉明显, 干后网眼深褐色, 基生侧脉短, 不延长, 侧脉5—8对, 两面凸起, 叶柄粗壮, 长8—10毫米; 托叶钻状披针形, 厚, 长5—10毫米。榕果球形或球状梨形, 单生或成对腋生, 直径约10毫米, 略粗糙, 疏生小瘤体, 顶端脐状, 基部收缩成柄, 柄长5—10毫米, 基生苞片3, 卵圆形, 干后反卷; 总梗极短; 雄花生榕果内壁近口部, 花被片4—6, 白色, 线形, 雄蕊1枚, 基部有退化的子房; 瘦花与雄花花被相似, 子房斜卵形, 花柱侧生; 雌花生另一植株榕果内, 花被片4, 线形, 质薄, 透