

花被片4, 膜质, 倒卵形; 瘦花具柄, 花被片4, 披针形, 子房光滑, 花柱短; 雌花花被片匙形, 长于子房, 子房白色。瘦果短。长圆形, 光滑, 花柱近侧生。

产云南(蒙自、河口、屏边、金平、元阳、西双版纳)。生于海拔350—1200米的山地或沟谷林中。印度北部、印度尼西亚(苏门答腊)也有。

亚组3. 斜叶榕亚组 Subsect. *Palaeomorphe* (King) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 446. 1959. — *Ficus* Sect. *Palaeomorphe* King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (1): 3. 1887. — Subgen. *Palaeomorphe* (King) Sata, Monogr. *Ficus* Form. and Philipp. 217. 1944.

瘦果长圆形, 顶部有龙骨或棱, 光滑; 雄花通常有退化子房; 叶排为两列, 叶柄短; 榕果有或无总梗, 钟乳体乳头状。乔木、灌木、匍匐、附生。

约19种, 分布亚洲、澳大利亚。我国约4种, 分布华南、西南、台湾。

系1. 斜叶榕系 Ser. *Pallidae* Miq. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 433. 1848; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 447. 1959 — Ser. *Euglabrifoliae* Sata Monogr. *Ficus* Form. and Philipp. 217, 218, 377. 1944.

中型乔木或大树, 通常附生; 托叶钻形, 直而硬; 叶革质, 两面有钟乳体; 榕果无侧生苞片。

76. 斜叶榕

Ficus tinctoria Forst. f. Prodr. Fl. Ins. Austral. Prodr. 76. 1786; Kanehira, Fl. Micron. 91. f. 20. 1, 1933; Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 475. 1959, in ibid. 21: 74. 1965; Li, Woody Fl. Taiwan 126. 1963; Stone in Micronesia 6: 251. 1970; 台湾植物志 2: 152. 1976; Yumazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. 31 (1): 14. 1983; H. Koba et al., Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 213. 1994.

76a. 斜叶榕 (原亚种)

Ficus tinctoria Forst. f. subsp. *tinctoria*

小乔木, 幼时多附生, 树皮微粗糙, 小枝褐色。叶薄革质, 排为两列, 椭圆形至卵状椭圆形, 长8—13厘米, 宽4—6厘米, 顶端钝或急尖, 基部宽楔形, 全缘, 一侧稍宽, 两面无毛, 背面略粗糙, 网脉明显, 干后网眼深褐色, 基生侧脉短, 不延长, 侧脉5—8对, 两面凸起, 叶柄粗壮, 长8—10毫米; 托叶钻状披针形, 厚, 长5—10毫米。榕果球形或球状梨形, 单生或成对腋生, 直径约10毫米, 略粗糙, 疏生小瘤体, 顶端脐状, 基部收缩成柄, 柄长5—10毫米, 基生苞片3, 卵圆形, 干后反卷; 总梗极短; 雄花生榕果内壁近口部, 花被片4—6, 白色, 线形, 雄蕊1枚, 基部有退化的子房; 瘦花与雄花花被相似, 子房斜卵形, 花柱侧生; 雌花生另一植株榕果内, 花被片4, 线形, 质薄, 透

明。瘦果椭圆形，具龙骨，表面有瘤体，花柱侧生，延长，柱头膨大。花果期冬季至翌年6月。

产海南，台湾。菲律宾、印度尼西亚（苏拉威西、松巴哇、马鲁古群岛）、巴布亚新几内亚、澳大利亚（北部）、密克罗尼西亚、波利尼西亚至塔希提等地也有分布。

76b. 匍匐斜叶榕（亚种）

Ficus tinctoria Forst. f. subsp. *swinhoei* (King) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 476. 1959, in *ibid.* 21: 74. 1965. — *F. swinhoei* King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1 (2): 81. pl. 101. 6. 1888; Kanehira, Form. Trees. rev. ed. 162. f. 111. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 51. f. 28—2. 1944; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 2: 139, f. 593. 1962. — *F. senicis* Merr. in Philipp. Journ. Sci. 18: 66. 1921.

岩生匍匐灌木，叶硬革质，粗糙，椭圆形，长3—7厘米，宽2.5—3.5厘米，先端钝，基部近心形，干后网脉不为褐色，气孔下陷。榕果近球形，直径约8毫米，总梗长约1.5毫米。花果期冬季至翌年6月。

产我国台湾。菲律宾也有。

76c. 斜叶榕（亚种）（西藏植物志） 图版47: 1—3

Ficus tinctoria Forst. f. subsp. *gibbosa* (Bl.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 476. 1959, et in *ibid.* 21: 74. 1965, et in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 30. 1963; 中国高等植物图鉴补编 1: 156. 1982, in clavi; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 40 (3): 499. 1983; 西藏植物志 1: 518. 1983; 云南种子植物名录，上册: 710. 1984; 横断山区维管植物，上册: 308. 1993; Nguyen T. Hiep in Tap Chi SINH HOC 16 (4): 63. 1994. — *F. reticulata* Thunb. Diss. Ficus 6: 12. 1786. — *F. gibbosa* Bl. Bijdr. 466. 1825. — *F. gibbosa* Bl. var. *rigida* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 3: 276. 1867. — *F. michelii* Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 8: 61. 1919; et Fl. Kouy-Tchéou 432. 1915; 海南植物志 2: 394. 1965. — *F. gibbosa* Bl. var. *cuspidifera* auct. non (Miq.) King; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 124. 1929.

乔木或附生。叶革质，变异很大，卵状椭圆形或近菱形，两则极不相等，在同一树上有全缘的也有具角棱和角齿的，大小幅度相差很大，大树叶一般长不到13厘米，宽不到5厘米，而附生的叶长超过13厘米，宽5—6厘米，质薄，侧脉5—7对，干后黄绿色。榕果径6—8毫米。花的结构与原种记载相符合。花果期6—7月。

产台湾、海南、广西、贵州、云南、西藏东南部（墨脱）、福建。泰国、缅甸、马来西亚西部、印度尼西亚有分布。生于海拔200—600米山谷湿润林中或岩石上。

76d. 凸尖榕（亚种）（云南种子植物名录） 图版47: 4—6

Ficus tinctoria Forst. f. subsp. *parastica* (Willd.) Corner in Gard. Bull. Sing. 17: