

23 (1); 23. 1963; et in Gard. Bull. Sing. **21**: 93. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 157. 1982, in clavi; Griers. et Long, Fl. Bhutan **1** (1): 99. 1983; 云南种子植物名录上册: 702. 1984; 横断山区维管植物上册: 305. 1993. Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 58. 1994. — *F. harlandii* Benth. Fl. Hongk. 336. 1861; 海南植物志 **2**: 388. 1965; 中国高等植物图鉴 **1**: 498, f. 995. 1972.

常绿小乔木，树皮黑褐色，枝粗糙，叶互生，纸质，倒卵形至长圆形，长 10—20 厘米，宽 4—7 厘米，先端具短尖，基部斜楔形或圆形，全缘或微波状，表面无毛，背面微被柔毛或黄色小突体；基生侧脉短，侧脉 6—9 对；叶柄长 1.5—4 厘米；托叶卵状披针形，长约 1.7 厘米。，榕果簇生于老干发出的瘤状枝上，近球形，直径 1.5—2 厘米，光滑，成熟桔红色，不开裂，总梗长 8—24 毫米，雄花和瘦花生于同一榕果内壁；雄花，生于其近口部，少数，具短柄，花被片 3—4，雄蕊 1 枚，花丝短；瘦花，具柄，花被片极短或不存，子房光滑，倒卵形，花柱近侧生，纤细，柱头膨大；雌花，生于另一植株榕果内，花被管状，围绕果柄下部。瘦果近斜方形，表面有小瘤体，花柱长，棒状。花期 5—7 月。

产广东（茂名）、香港、广西、云南（西双版纳、红河、弥勒、河口、金屏、麻栗坡）等地。生于溪边岩石上或森林中。锡金、印度东北部、孟加拉国、缅甸、泰国、越南、马来西亚西部、印度尼西亚（广布）、菲律宾、加里曼丹也有。

84. 黄果榕（新拟） 黄果猪母乳（台湾植物志）

Ficus benguetensis Merr. in Govt. Lab. Publ. (Philipp.) **29**: 10. 1905; Elmer, Leaflet Philipp. Bot. **1**: 54. 1906; Corner in Gard. Bull. Sing. **21**: 89. 1965; Hatusima, Fl. Ryukyus. 228. 1971; Kitam. et Murata, Col. Ill. Woody Pl. Jap. **2**: 239. 1979; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. **31** (1): 15. 1983. — *F. kotoensis* Hayata, Icon. Pl. Form. **8**: 126. f. 53. 1919. — *F. harlandii* Benth. var. *kotoensis* (Hayata) Sata in Journ. Soc. Trop. Agr. **6**: 21. 1934. — *F. fistulosa* f. *benguetensis* (Merr.) Liu et Liao in Bull. Exp. For. Nat. Taiwan Univ. **114**: 68. 1974; 台湾植物志 **2**: 134. 1976. — *F. harlandii* auct. non Benth. Kanehira, Form. Trees rev. ed. 154. f. 101. 1936; Sata Monogr. Ficus Form. and Philipp. **29**. f. 13-1, 34. 1944; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan **2**: 725, f. 579. 1972.

中型乔木，老枝粗糙，幼枝纤细，黄褐色至红紫色，疏被粗毛。叶长圆形至长圆状卵形，长 9—13 厘米，宽 4—6 厘米，先端急尖而具短尖头，基部斜楔形或圆形或心形，全缘或微波状，表面无毛，中脉和小脉清晰，背面中脉及小脉突起，沿脉被粗硬毛，基生侧脉较长，侧脉 5—7 对；叶柄圆柱形，长 0.7—1.5 厘米，散生黄褐色粗毛；托叶卵状披针形，长 1.8 厘米，早落。榕果腋生或簇生于无叶瘤状短枝上，近球形，直径 1—1.5 厘米，成熟黄色，光滑，或具瘤状凸体。基生苞片基部合生，三角形，全缘或有锯齿或

睫毛；总梗长约1厘米；雌花，具短柄，无毛，花被管状或钟状，膜质，透明，子房斜卵圆形，长约0.5毫米，花柱长1—1.5毫米，顶端具粗毛。瘦果倒卵形，长约1毫米，微歪斜，基部具短柄。 花果期为春夏。

产我国台湾各岛屿阔叶林中。日本琉球、菲律宾也有。

组6. 橙黄榕组 Sect. *Kalosyce* (Miq.) Corner in Gard. Bull. Sing. **18**: 21. 1960. —
Synoecia Miq. sect. *Kalosyce* et sect. *Verae* Miq. Fl. Ind. Bat. **1**(2): 328. 329. 1859. —
Urostigma Gasp. sect. *Apiosyce* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 440. 1860.

木质藤状灌木；叶常不对称，背面黄色，被微柔毛；花具柄，花被片3，红色或白色，雄蕊1枚，花药无短尖；榕果大。多为老茎生花。

约5种，分布印度北部、缅甸、巴布亚新几内亚。

系1. 橙黄榕系 Ser. 1. *Punctatae* Corner in Gard. Bull. Sing. **18**: 22. 1960.

叶常不对称，背面黄色，被微柔毛；榕果大。老茎生花。

我国有下列1种。

85. 橙黄榕 (云南种子植物名录)

Ficus aurantiaca Griff. Notul. **4**: 394. 1854; Icon. Pl. Asiat. f. 505. 1854; Corner in Gard. Bull. Sing. **18**: 23. 1960, in ibid. **21**: 61. 1965; Yamazaki in Journ. Phytogeogr. and Taxon. **31**(1): 9. 1983; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16**(4): 57. 1994. —
F. terasonensis Hayata, Icon. Pl. Form. **8**: 116, f. 39. 1919; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 163. f. 113. 1936; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 48. f. 6, 7. 1944. — *F. megacarpa* Merr. in Gov. Lab. Publ. (Philipp.) **17**: 14. 1904; Sata, Monogr. Ficus Form. and Philipp. 37, f. 2—4. 1944; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan **2**: 728. f. 582. 1962. — *F. aurantiaca* Griff. var. *parvifolia* Corner in Gard. Bull. Sing. **18**: 23. 1960; Liu et Liao 台湾植物志 **2**: 129. 1976.

大型常绿木质藤状灌木；枝条红褐色。叶革质，椭圆形至倒卵形，长2.5—6.5厘米或更长，宽1.5—4厘米，表面近无毛，背面被微柔毛，先端急尖，圆或微钝，基部楔形或钝形，边缘全缘微反卷，基生叶脉三出，侧脉3—4对；叶柄长5—10毫米；托叶线状披针形，膜质，无毛，长5—10毫米，早落。榕果单生或成对成簇腋生或生于无叶枝上，球形，直径5—7厘米，微被柔毛，成熟时橙黄色，基生苞片3—4，较薄，总梗粗短，长约0.6—1.2厘米；雄花多数，散生于榕果内壁，具柄，花被片2—3，雄蕊1枚，花丝长；瘦花具柄或无柄，花被片3—4，线形，子房光滑，斜卵圆形，花柱微侧生，柱头2裂；雌花无柄，花被片3，线形，子房光滑，长圆形，花柱近侧生，纤细，柱头2裂。

产我国台湾（台东、兰屿、绿岛）。菲律宾、印度尼西亚、越南、泰国、缅甸等地也