

本变种广泛分布于秦岭、淮河以南，自东向西海拔渐高，广西升至 900 米，陕西升至 1 200 米，贵州升至 1 800 米，云南升至 2 500 米，渐向 *var. duclouxii* (Lévl. et Vant.) Corner 过渡。与之区别在于叶背网脉突出，多褐色长毛，榕果仅中等大，无柄，多少圆锥状或梨形，被长毛，顶生及基生苞片均达 4—6.5 毫米。

94. 贵州榕 (植物分类学报) 图版 56: 1—5

*Ficus guizhouensis* S. S. Chang in *Acta Phytotax. Sinica* 20 (1): 96. 1982.

藤状灌木，幼枝、叶柄密被短柔毛，叶排为 2 列，近革质，长圆形或椭圆状长圆形，长 5—14 厘米，宽 2—5 厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形或微钝，表面叶脉下凹，背面凸起，全缘，表面绿色，粗糙，散生贴伏糙毛，背面浅绿色，密被褐色柔毛和疏生伏贴糙毛，成长脱落。侧脉 4—5 对，基脉延长至叶片 1/2 处；叶柄长 1—1.5 厘米，密被褐色糙毛。托叶披针形，膜质，长约 5 毫米。榕果成对腋生或单生，近球形，直径 8—10 毫米，幼时密被褐色柔毛，基生苞片三角状卵形，顶生苞片 3，下陷，总梗长 1—1.5 毫米，密被褐色糙毛，雄花具柄，生于榕果近口部或散生，花被 4，刚毛丰富，无石细胞，雄蕊 2，花药椭圆形，长约 1 毫米，具短尖，花丝短，分离；瘦花长 4 毫米，花被 4，下半部黄色，上部红色，子房长圆形，花柱短，侧生，柱头漏斗形；雌花无柄，花被 4。瘦果光滑，椭圆形，长 3 毫米，花间有刚毛。花期 4—5 月，果期 6—7 月。

产贵州(榕江，模式标本产地)、广西(大苗山)、云南东南部(西畴)。生于海拔 500—650 米的石灰岩山地。

95. 云南榕 (植物类学报)

*Ficus yunnanensis* S. S. Chang in *Acta Phytotax. Sin.* 22 (1): 69, f. 12. 1984.


乔木，高 7—8 米，小枝具纵棱，密被糙毛，小枝径 3—4 毫米。叶纸质，斜卵形，长 7—16 厘米，宽 3.5—8 厘米，先端尾状渐尖，尖长 1—2 厘米，基圆形，偏斜，全缘，表面被糙硬毛，叶背中肋和网脉明显突起，基生侧脉延长至叶的 1/3—1/2，密被黄色长柔毛；叶柄长 5—12 毫米，密被黄色糙硬毛；托叶披针形，长 10—15 毫米，密被贴生的黄褐色毛，迟落。榕果腋生，近无柄，卵球形或近圆形，顶生苞片稍直立，被毛，基生苞片 3，三角形，密被黄色硬毛，榕果直径 2—3 厘米，密被黄褐色糙毛，或老时中部毛脱落。雌花多数，具柄，花被片 4，倒卵形至椭圆形，长约 1 毫米，红色，无毛，子房无柄，倒卵形，花柱侧生，柱头漏斗形；中性花无柄，或具短柄，散生在近口部，花被片 4，倒卵状椭圆形，红色，子房椭圆形，花柱侧生，柱头丝状。

产云南景东、楚雄、腾冲等地。生 1 800—2 400 米山坡混交林中。模式采自景东。

96. 那坡榕 (广西植物) 图版 55: 7—8

*Ficus napoensis* S. S. Chang in *Guihaia* 3 (4): 305, f. 7 1983.

藤状灌木，幼枝，叶柄密被锈色短柔毛。叶排为两列，近革质，倒卵形或卵状椭圆形，长 2.5—7.5 厘米，宽 1.5—3.5 厘米，先端渐尖或为短尾状，尾长 4—6 毫米，基部



图版 56 1—5. 贵州榕 *Ficus guizhouensis* S. S. Chang: 1. 果枝, 2. 雌花, 3. 雄花, 4. 瘦花, 5. 叶背面示毛被。6—9. 多脉榕 *F. polynervis* S. S. Chang: 6. 果枝, 7. 叶背面示网脉, 8. 瘦花, 9. 雄花。 (谢 华绘)