

11—17 厘米，宽 4—7 厘米，基部宽楔形或近圆，钟乳体短杆状，长约 0.1 毫米；雄花序较长，长约 2 厘米，序梗被微柔毛。花期 4 月。

产云南西北部。生于海拔 2 300 米山谷阴湿处。模式标本采自泸水。

36. 生根冷水花 (广西植物名录)

Pilea wightii Wedd. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 1: 186. 1854, et in DC. Prodr. 16 (1): 125. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 554. 1888, p. p.; C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (3): 73. 1982. — *P. hugelii* Bl. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2 (4): 53. 1856. — *P. radicans* auct. non (Swartz) Wedd.; Wight, Ic. pl. Ind. Or. 6: 9, t. 1974. 1853.

草本，无毛，地下茎匍匐。茎肉质，高 20—30 厘米，多分枝。叶膜质，卵形或披针形，长 2—6.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端渐尖，基部圆形或微缺，边缘有锯齿，钟乳体条形，长约 0.3 毫米，基出脉 3 条，侧脉多数，斜展；叶柄长 0.5—3 厘米；托叶膜质，三角形，长 1—2 毫米，宿存。雌雄异株或同株；雄花序具长梗，聚伞圆锥状，长过叶或与叶近等，雌花序较短。雄花具梗，在芽时长 1.5 毫米；花被片 4，合生至中部，先端有明显的短角或近喙状，外面上部有杆状钟乳体；雄蕊 4；退化雌蕊小，圆锥形或近钻形。瘦果卵形，长约 1 毫米，先端稍偏斜，光滑，宿存花被不等 3 裂，中间的一枚最长。花期 6—7 月。

产广东、广西。生于低山与中山山谷路边。印度南部和斯里兰卡有分布。

本种与喙萼冷水花 *P. symmeria* Wedd. 近似，但具匍匐地下茎，瘦果较小可以区别。

37. 喙萼冷水花 (植物研究)

Pilea symmeria Wedd. Monogr. Urtic. 246. 1856, et in DC. Prodr. 16 (1): 134. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 554. 1888; Hara, Fl. East. Himal. 62. 1966, excl. pl. austro-sinen.; C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (3): 74. 1982; 西藏植物志 1: 540, 图 171 (7—8). 1983; Grierson et Long, Fl. Bhutan 1 (1): 113, fig. 11a—c. 1983.

多年生草本，无毛。茎下部多少木质化，上部肉质，高 30—120 厘米，无毛，分枝或不分枝。叶卵形、卵状披针形，或长圆状披针形，有时微偏斜，长 4—14 厘米，宽 2—7 厘米，先端尾状渐尖，基部浅心形或圆形，边缘自基部至先端有锯齿或圆齿状锯齿，上面疏生透明白粗毛，后渐脱落，下面仅基部有短柔毛，钟乳体极小，不明显，杆状，长近 1 毫米，基出脉 3 条，侧脉多数，横展；叶柄长 1—5 厘米，无毛，托叶小，三角形，长 1—2 毫米，常在叶柄间合生成一耳突，宿存。花雌雄异株或同株；花序单生于叶腋，聚伞圆锥状，具长梗或短梗，雄的与叶近等长，雌的较短；苞片三角状卵形，明显，长 1—1.5 毫米。雄花具梗，在芽时长 1.5—2 毫米；花被 4 深裂，带粉红色，干时灰绿色，光滑，裂片外面近先端有角状突起或呈喙状；雄蕊 4；退化雌蕊小，钻形或圆锥形。雌花长约 1 毫米；花被片 3，不等大，下部合生。瘦果卵形，顶端偏斜，微扁，长 1.2—1.5