

枚三角状卵形，比中间的短2—3倍。瘦果卵球形，稍扁，顶端稍偏斜，长约1毫米。
花期6—8月，果期9—10月。

产西藏东南部。生于山谷常绿和阔叶落叶混交林下或灌丛下阴湿处，有时长在树干的苔藓上，海拔1600—2700米。不丹、印度东北部有分布。

74. 具柄冷水花 (西藏植物名录)

Pilea khasiana (Hook. f.) C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (3): 111. 1982. — *P. anisophylla* Wedd. var. *khasiana* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 552. 1888; 西藏植物志 1: 543. 1983.

多年生草本，具匍匐根状茎。茎倾斜上升，肉质，高20—80厘米，粗2—4毫米，无毛，干时变蓝绿色，不分枝或分枝。叶近膜质，同对的不等大，叶片稍不对称，有时异形，大者：椭圆状或卵状披针形、长圆状卵形，长5—13厘米，宽1.5—4.5厘米，先端长尾状渐尖，基部微缺或圆形，叶柄长1—3厘米，无毛；小者：长圆形、椭圆形或镰状披针形，长1.8—6厘米，宽0.6—2.2厘米，先端渐尖，基部耳状戟形或钝圆形，叶柄0.3—1厘米，无毛；全部叶的边缘近全缘，近先端有1—2枚浅锯齿，两面无毛，下面有紫红色斑点，钟乳体纺锤形，在上面较细小，长0.1—0.2毫米，在下面较粗大，长0.4—0.5毫米，基出脉3条，其侧生的一对弧曲，伸达先端，二级脉多数，平行，横展，外向的二级脉在边缘环结；托叶小，三角形，长1—2毫米，宿存。花序雌雄异株；雄花序圆锥状，单生于叶腋，幼时向内拳卷，长达10厘米，花序梗长达5厘米，无毛，团伞花序由数朵花组成，稀疏地着生于花轴的内侧。雄花在芽时长约1毫米，粉红色；花被片4，卵形，外面疏布钟乳体，近先端有不明显的短尖头；雄蕊4；退化雌蕊小，圆锥状。(雌花未见) 花期7月以后。

产西藏东南部。生于海拔1500—2200米山谷两侧常绿阔叶林下阴湿处。印度东北部有分布。

75. 异叶冷水花 (西藏植物名录) 图版 31: 4—7

Pilea anisophylla Wedd. Monogr. Urtic. 193. 1856, et in DC. Prodr. 16 (1): 117. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 552. 1888; Hara, Fl. East. Himal. 60. 1966, excl. pl. Taiwan; C. J. Chen in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (3): 111, pl. 8 (4—7). 1982; 中国高等植物图鉴，补编 1: 176. 1982; 西藏植物志 1: 543, 图 174 (1—3). 1983. — *Urtica anisophylla* Wall. Cat. no. 4594. 1832, nom. nud. — *P. anisophylla* Wedd. var. *robusta* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 552. 1888, syn. nov. — *P. secunda* Chien Bull. Chin. Bot. Soc. 1 (1): 4. 1935.

草本。具匍匐地下茎，倾斜上升，肉质，高30—150厘米，粗3—10毫米，无毛或在上部疏生串珠毛，常有分枝。叶近膜质，在同对异形、极不等大，大者：不对称，镰状披针形、卵状或长圆状披针形，有时卵形，长5—16厘米，宽2—5厘米，先端长尾状渐尖，基部微缺，浅心形或耳状深心形，叶柄长1—2.5厘米，叶柄上面和叶片上面主脉