

组 3. 钝叶楼梯草组 Sect. *Laevisperma* (Hatusima) Yamazaki in Journ. Jap. Bot. 47(6):180. 1972. — *Pellionia* Gaud. Sect. *Laevisperma* Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus. 13: 37. 1967.

草本。叶具三出脉，边缘有小齿。雄花序不分枝，有长梗及少数花；花序托不明显。雌花序无梗，有 1—20 花；花序托近不存在或很小；苞片 2—15，形成总苞；小苞片不存在或 10—20，稀疏。瘦果较大，长 1.2—2.2 毫米，平滑，无纵肋。

约 4 种，我国有 2 种。

70. 墨脱楼梯草 (植物研究)

Elatostema medogense W. T. Wang in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (1): 10. 1982.

70a. 墨脱楼梯草 (原变种)

E. medogense W. T. Wang var. *medogense*

小草本。茎直立或渐升，长 7—20 厘米，上部被向前曲的短毛，不分枝或有短分枝。叶无柄或具短柄；叶片草质，斜椭圆形，长 0.9—2.8 厘米，宽 0.5—1.4 厘米，顶端急尖，基部狭侧钝，宽侧耳形或宽楔形，边缘在狭侧中部以上，在宽侧除下部 1/3 全缘外均有浅齿，上面无毛，下面沿脉疏被短糙毛，钟乳体稀疏，不明显或稍明显，长 0.2—0.35 毫米，三出脉，侧脉每侧约 2 条；叶柄长达 1 毫米，无毛；托叶狭条形，长 1.5—2 毫米，宽 0.2—0.3 毫米，无毛。花序雌雄同株或异株。雄花序具长梗，约有 10 花；花序梗长约 2 厘米，无毛；花序托小，椭圆形，长约 3.5 毫米，无毛；苞片约 5，三角形或狭三角形，长 2.5—3.5 毫米，无毛，顶端兜状；小苞片白色，条形，长 1.5—2 毫米，无毛。雄花无毛，具梗，花梗长约 2 毫米；花被片 4，椭圆形，长约 1.5 毫米，其中 2 枚在外面顶端之下有短角状突起；雄蕊 4，长约 2 毫米；退化雌蕊小，长 0.2 毫米。雌花序生茎顶部叶腋，具极短梗，近圆形，直径 2—6 毫米，有 10—20 朵雌花；花序梗长约 1 毫米；花序托近圆形，直径达 3.5 毫米，无毛；苞片约 15，外面 2 枚较大，三角形，长约 2.5 毫米，宽 1.8 毫米，其他的较小，条形，长约 2 毫米，宽 0.6—0.8 毫米，边缘中部之上疏被糙毛，顶端兜状；小苞片稀疏，狭条形或倒披针状狭条形，长约 2 毫米，宽约 0.2 毫米，上部疏被糙毛。瘦果圆柱状卵球形，长约 1.2 毫米，光滑，无纵肋。花期 7 月。

产西藏墨脱 (模式产地)。生于山地林下，海拔 1900 米。

70b. 长叶墨脱楼梯草 (变种)

E. medogense W. T. Wang var. *oblongum* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (1): 11. 1982.

与墨脱楼梯草的区别：叶长圆形，长度为宽度的 3 倍，长 1.5—2.9 厘米，宽 0.5—0.9 厘米，顶端渐尖或短骤尖。

产墨脱 (模式产地)。生于山地苔藓林下，海拔 2300 米。

71. 钝叶楼梯草 (秦岭植物志) 图版 49: 7—10 (见 243 页)

Elatostema obtusum Wedd. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 1: 190. 1854; in DC. Prodr.