

达1.5毫米，无毛；托叶膜质，披针状长圆形，长约1.6厘米，无毛。雄、雌花序异株。雄花序具短梗；花序梗长约3.6毫米，无毛；花序托椭圆形，长约6.5毫米；苞片不明显；小苞片多数，密集，船状披针形，长1.5—1.8毫米，有短睫毛。雄花：花梗长达1.8毫米，无毛；花被片5，船状椭圆形，长约1.8毫米，合生近中部，边缘有疏短睫毛，其中3片的外面顶部之下有短突起；雄蕊5；退化雌蕊不明显。雌花序腋生，具梗；花序梗长6—10毫米，无毛；花序托长圆形或近蝴蝶形，长7—10毫米，宽4—8毫米，在中部2深裂，无毛；苞片近不存在；小苞片极多，半透明，条形，长0.8—1.2毫米，边缘上部有短毛。雌花无明显花被片；子房长椭圆形，长约0.5毫米，柱头长0.08毫米。瘦果长卵球形，长约0.7毫米，约有8条细纵肋。花期5—6月。

产西藏(墨脱)、云南西北部(福贡、贡山)。生于山地常绿阔叶林中，海拔850—2200米。模式标本采自云南贡山。

100b. 毛茎耳状楼梯草 (变种)

*E. auriculatum* W. T. Wang var. *strigosum* W. T. Wang in C. Y. Wu, Fl. Xizang. 1: 552. 1983.

与耳状楼梯草的区别：茎上部被短柔毛。

产西藏墨脱(模式产地)。生于山谷林边溪边，常为沟边草丛优势种，海拔850—1800米。

系3. 盘托楼梯草系 *Ser. Dissecta* W. T. Wang in Bull. Bot. Lab. N.-E. For. Inst. 7: 75. 1980.

叶具三出脉或半离基三出脉，边缘有齿。雄花序具长梗，雌花序无梗。

系名模式：盘托楼梯草 *E. dissectum* Wedd.

我国有19种。

101. 微晶楼梯草 图版63: 3—4

*Elatostema papillosum* Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 9: 327. 1856; in DC. Prodr. 16 (1): 188. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 569. 1888.

多年生草本。茎高25—50厘米，不分枝或分枝，被反曲短伏毛，毛在茎顶部稍密。叶具短柄或近无柄；叶片薄纸质，斜狭倒卵形或斜狭椭圆形，长4.5—13.5厘米，宽2—5.5厘米，顶端骤尖或尾状(尖头披针状条形，长达2.3厘米，全缘)，基部在狭侧楔形，在宽侧宽楔形或近耳形，边缘下部1/3处全缘，其上有浅牙齿，上面无毛，下面沿脉被极短的贴伏柔毛，钟乳体稍密，不明显或明显，长0.1—0.3毫米，半离基三出脉或离基三出脉，侧脉在狭侧约3条，在宽侧约5条；叶柄长达5毫米，密被短伏毛；托叶披针状条形，长5—7毫米，宽0.5—0.8毫米，顶端尖锐，无毛。退化叶心形或卵形，长3—10毫米，每侧各有1齿。花序雌雄同株或异株。雄花序具长梗；花序梗长2—5.5厘米，无毛；花序托椭圆形，长1.4—2.5厘米，宽1—1.4厘米；苞片约8，圆卵形，宽5—12