

色，宽条形或条形，长1.5—2毫米，顶端有短突起，上部边缘有稀疏短睫毛。雄花有细长梗；花被片4，淡绿白色，船状椭圆形，长约1.2毫米，基部合生，其中2枚的外面顶端之下有长0.5—1毫米的角状突起，顶部有稀疏短柔毛；雄蕊4，花药白色；退化雌蕊极小。雌花序无梗，单生茎上部叶腋；花序托近长方形或扇状斜方形，长5—12毫米，宽3.5—7毫米，有短柔毛；苞片小，扁半圆形，长约0.5毫米，背面中央有长约0.5毫米的龙骨状突起；小苞片多数，密集，楔形、楔状条形或匙形，长0.8—1毫米，顶端近截形，外面顶部之下具短突起，顶部被睫毛。雌花：花被不明显；子房椭圆形，长约0.4毫米，约有6条褐色纵肋，柱头白色，小。花期8月。

产西藏墨脱（模式产地）。生于山地阔叶林下，海拔2000米。

105b. 细梗楔苞楼梯草（变种）

*E. cuneiforme* W. T. Wang var. *gracilipes* W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 28 (3): 319. 1990.

与楔苞楼梯草的区别：雄花序梗细，粗0.8毫米，小苞片无毛。

产西藏墨脱（模式产地）。生于热带雨林中，海拔1850米。

106. 绢毛楼梯草（东北林学院植物研究室汇刊）

*Elatostema laxisericeum* W. T. Wang in Bull. Bot. Lab. N.-E. For. Inst. 7: 76. 1980; 云南种子植物名录，上册，721. 1984.

草本。茎高约80厘米，顶部疏被贴伏的绢状短柔毛，其他部分无毛。叶具柄；叶片斜椭圆形，长10—13.5厘米，宽4.4—5.5厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部在狭侧楔形，在宽侧宽楔形或圆形，边缘在基部之上有浅牙齿，上面散生少数短硬毛，下面沿中脉及侧脉疏被绢状短柔毛，钟乳体明显，密，长0.1—0.15毫米，半离基三出脉，侧脉在狭侧3—4条，在宽侧约4条；叶柄长5—11毫米；托叶膜质，条状披针形，长约12毫米，无毛。雄花序单生叶腋，有长梗；花序梗长1.8—2.2厘米，密被极短的毛；花序托狭椭圆形，长13—18毫米，宽7—9毫米，边缘有不明显苞片；苞片宽三角形，长约0.8毫米；小苞片狭条形，长约1.5毫米。雄花蕾直径约1.2毫米，无毛，五基数。花期9—10月。

产云南禄春（模式产地）。生于山谷林中，海拔630米。

107. 潞西楼梯草（植物研究） 图版59: 7—9

*Elatostema luxiense* W. T. Wang in Bull. Bot. Res. (Harbin) 2 (1): 18, pl. 2, fig. 7—9. 1982.

多年生草本。茎高约25厘米，无毛，有稍密的钟乳体，不分枝。叶无柄，无毛，草质，斜长圆形，长9—12.5厘米，宽2.5—3.8厘米，顶端尾状渐尖（尖头全缘），基部在狭侧楔形，宽侧耳形，边缘下部全缘，其上部有小牙齿，钟乳体稀疏，明显，长0.2—0.5毫米；托叶钻形，长5—7毫米。雄花序单生，具细梗；花序梗长约1.5厘米，无毛；花序托不规则半椭圆形，长约10毫米，无毛；苞片条形或宽条形，长1—2.5毫米，顶