

6 毫米, 无毛; 花序托初似球形或似无花果的隐头花序, 直径约 1.2 厘米, 顶部的宽卵形苞片互相覆压, 后花序托开展并二深裂, 近蝴蝶形, 宽约 3 厘米; 小苞片狭披针形, 长约 4 毫米, 无毛。雄花有梗: 花被片 5, 狭椭圆形, 长约 2 毫米, 下部合生, 无毛, 外面顶端之下有短角状突起; 雄蕊 4; 退化雌蕊极小。雌花序具极短梗, 有多数花; 花序托长方形或近方形, 长 3—10 毫米, 边缘的苞片宽卵形, 顶端有长 1—2 毫米的角状突起; 小苞片多数, 密集, 倒梯形, 长约 1 毫米。雌花无梗或有梗: 子房狭卵形, 与小苞片近等长。瘦果狭卵球形, 长 0.8—1 毫米, 约有 6 条不明显纵肋。花期 6—9 月。

产广西西北部、贵州、湖南西北部、四川南部及东部、湖北西部。生于山谷林中或沟边石上, 海拔 500—1100 米。在越南北部也有分布。模式标本采自湖北宜昌。

在四川古蔺民间供药用, 全草可祛风去湿。

10. 藤麻属 *Procris* Comm. ex Juss.

Comm. ex Juss. Gen. 403. 1789; Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 191.

1869.

多年生草本或亚灌木, 常无毛。叶二列, 两侧稍不对称, 全缘或有浅齿, 有羽状脉, 钟乳体条形, 极小; 托叶小, 全缘。退化叶常存在, 与正常叶对生, 小。雄花簇生, 排列成聚伞花序, 花梗无苞片。雌花序头状, 无梗或有短梗, 花序梗顶端膨大形成球状或棒状的花序托; 小苞片狭匙形。雄花: 花被 5 深裂, 裂片倒卵形, 肉质; 雄蕊 5; 退化雌蕊球形或倒卵形。雌花密集: 花被片 3—4, 倒卵形, 兜状, 肉质; 子房卵形, 比花被片稍短, 柱头小, 画笔状。瘦果卵形或椭圆形。

约 16 种, 分布于亚洲及非洲热带地区。我国 1 种, 分布于西南、华南及台湾。

1. 藤麻 图版 71: 1—2

Procris wightiana Wall. [Cat. n. 4638. 1831] ex Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 9: 336. 1856; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 67. 1927; H. Schröter in Repert Spec. Nov. Regni Veg. 45: 179, 257. 1938; 海南植物志 2: 412, 图 494. 1965. — *P. laevigata* auct. non Bl.; Hook. Ic. Pl. 13: t. 1295. 1879; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 575. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 484. 1899; 中国高等植物图鉴 1: 516, 图 1032. 1972; S. T. Liu et W. D. Huang in Li, Fl. Taiwan 2: 224, pl. 275. 1976; 福建植物志 1: 467, 图 424. 1982.

多年生草本。茎肉质, 高 30—80 厘米, 不分枝或分枝, 无毛。叶生茎或分枝上部, 无毛; 叶片两侧稍不对称, 狭长圆形或长椭圆形, 长 (4.5—) 8—20 厘米, 宽 (1.5—) 2.2—4.5 厘米, 顶端渐尖, 基部渐狭, 边缘中部以上有少数浅齿或波状, 钟乳体稍明显或明显, 长 0.1—0.3 毫米, 侧脉每侧 5—8 条; 叶柄长 1.5—12 毫米; 托叶极小, 卵形, 脱落。退化叶狭长圆形或椭圆形, 长 5—17 毫米, 宽 1.5—7 毫米。雄花序通常生于雌花