

雄花近无梗，四基数。瘦果无柄或具柄。

组名模式：白面苧麻 *B. clidemioides* Miq.

我国有 4 种。

7. 白面苧麻 (广西植物名录)

Boehmeria clidemioides Miq. Pl. Jungh. 1: 34. 1851; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 152. 1929; 西藏植物志 4: 555. 1983. — *B. sidaefolia* Wedd. in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 1: 203. 1854.

7a. 白面苧麻 (原变种)

B. clidemioides Miq. var. ***clidemioides***

多年生草本或亚灌木；茎高 0.9—3 米，不分枝或有少数分枝，上部多少密被短伏毛。叶对生，上部的叶有时近对生，同一对叶常不等大；叶片纸质或草质，卵形、狭卵形或长圆形，长 5—14 厘米，宽 2.5—7 厘米，顶端长渐尖或骤尖，基部圆形，稍偏斜，边缘自中部以上有小或粗牙齿，两面有短伏毛，上面常粗糙，基出脉 3 条，侧脉 2—3 对；叶柄长 0.7—6.8 厘米。穗状花序单生叶腋，通常雌雄异株，长 4—12.5 厘米，顶部有 2—4 叶；叶狭卵形，长 1.5—6 厘米；团伞花序直径 2—3 毫米，除在穗状花序上着生外，也常生于叶腋。雄花无梗；花被片 4，椭圆形，长约 1.2 毫米，下部合生，外面有疏毛；雄蕊 4，长约 2 毫米，花药长约 0.6 毫米；退化雌蕊椭圆形，长约 0.5 毫米。雌花：花被椭圆形或狭倒卵形，长 0.6—1 毫米，果期长约 1.5 毫米，顶端有 2—3 小齿，外面上部有短毛；柱头长 0.7—1.8 毫米。花期 6—8 月。

产西藏东南部、云南、湖南西部。生于山谷林中或林边，海拔 1300—2500 米。自东喜马拉雅至越南、马来半岛和印度尼西亚也有分布。


7b. 序叶苧麻 (中国高等植物图鉴) 合麻仁、水苧麻、水苏麻、米麻、野麻藤 (四川峨眉) 图版 74: 1—3

Boehmeria clidemicides var. ***diffusa*** (Wedd.) Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7: 152. 1929; Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 9: 266. 1934; 中国高等植物图鉴 1: 517, 图 1034. 1972; 福建植物志 1: 473, 图 429. 1982; 安徽植物志 2: 126. 1987. — *B. diffusa* Wedd. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 9: 356. 1856; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 484. 1899; 秦岭植物志 1 (2): 114. 1974. — *B. comosa* Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 205. 1869.

与白面苧麻的区别：叶互生，或有时茎下部少数叶对生。茎常多分枝。

产云南、贵州、广西和广东的北部、福建、浙江、安徽南部、江西、湖南、湖北西部、四川、甘肃和陕西的南部。生于丘陵或低山山谷林中、林边、灌丛中、草坡或溪边，海拔 300—1700 米，在云南和四川西南部达 1800—2400 米。越南、老挝、缅甸、印度、锡金、尼泊尔也有分布。

在四川民间全草或根供药用，治风湿、筋骨痛等症。茎、叶可饲猪。



图版 74 1—3. 序叶苎麻 *Boehmeria chidemoides* Miq. var. *diffusa* (Wedd.) Hand.-Mazz.: 1. 植株上部, 2. 雄花, 3. 雌花。4. 滇黔苎麻 *B. pseudotricuspis* W. T. Wang: 叶及腋生花序, 5. 阴地苎麻 *B. umbrosa* (Hand.-Mazz.) W. T. Wang: 叶及腋生花序。(刘春荣绘)