

1种，在我国分布于自西藏东南部至台湾的亚热带地区（但在广东、江西东部、浙江无分布），尼泊尔、斯里兰卡、印度到越南北部也有分布。

1. **微柱麻**（云南植物研究） 小米麻草、水水苏麻、地水麻（四川） 图版 88：1—7（见 403 页）

Chamabainia cuspidata Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 6:t. 1981. 1853; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 580. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 489. 1899; Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 1: 21. 1925; 中国高等植物图鉴 1: 521, 图 1041. 1972; 湖北植物志 1: 183. 1976; T. S. Liu et W. D. Huang in Li, Fl. Taiwan 2: 172, pl. 254. 1976; W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (1): 14. 1981; 福建植物志 1: 471. 1982; 贵州植物志 4: 79. 1989. ——*Urtica squamigera* Wall. Cat. n. 4592. 1830, nom. nud. ——*Chamabainia squamigera* Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 218. 1869.

1a. **微柱麻**（原变种）

C. cuspidata Wight var. **cuspidata**


多年生草本；茎直立或渐升，高 12—60 厘米，不明显四棱形，有 4 条浅纵沟，不分枝或分枝，有短曲柔毛，有时还混生开展的长柔毛，在上部毛较密。叶对生；叶片革质，菱状卵形或卵形，稀狭卵形，长 1—6.5 厘米，宽 0.6—3 厘米，顶端通常骤尖，稀短渐尖或急尖，基部宽楔形，边缘在下部全缘，其上每侧有 3—10 个小牙齿，两面均有稀疏的短柔毛，侧脉约 2 对；叶柄长 2—10 毫米；托叶膜质，斜三角形，长 4—6 毫米，常包围团伞花序，中肋在顶端伸出成短尖头。团伞花序单性，雌雄异株，通常雌雄同株，茎顶部的雄性，其下的雌性，有多数密集的花；雄花序的苞片卵形、三角形至披针形，长 1—1.5 毫米，雌苞片极小，钻形或狭披针形，长 0.6—1 毫米。雄花：花梗长达 3 毫米；花被片 3—4，狭椭圆形，长 1.5—2 毫米，合生至中部，顶端尾状渐尖，外面上部有疏毛，在顶端之下有短角状突起；雄蕊 3—4，长约 2 毫米；退化雌蕊倒卵形或长椭圆形，长约 0.3 毫米。雌花：花被椭圆形或倒卵形，长 0.6—0.8 毫米，顶部有短毛，果期菱状宽倒卵形或倒卵形，长 1—1.2 毫米，周围有狭翅；柱头长约 0.2 毫米。瘦果近椭圆球形，长约 1 毫米，暗褐色，稍带光泽。 花期 6—8 月。

产西藏南部和东南部、云南、广西、贵州、四川、湖北西南部、湖南、江西西部、福建、台湾。生于山地林中、灌丛中、沟边或石上，海拔 1 000—2 000 米，在云南西北部和西藏可达 2 700—2 900 米。尼泊尔、锡金、印度、斯里兰卡、缅甸、越南北部也有分布。

全草或根在四川民间药用，治胃腹疼痛等症。

1b. **小叶微柱麻**（变种）

Chamabainia cuspidata var. **morii** (Hayata) W. T. Wang in Acta Bot. Yunnan. 3 (1): 15. 1981. ——*C. morii* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 282. 1911; Ic. Pl. Formos. 6: 61. 1916; Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 1: 21. 1925;



图版 88 1—7. 微柱麻 *Chamahainia cuspidata* Wight: 1. 雌株, 2. 雄花, 3. 雄蕊, 4. 退化雌蕊, 5. 雄团伞花序一部分, 6. 瘦果及宿存花被, 7. 瘦果。8. 多齿微柱麻 *C. cuspidata* var. *denticulosa* W. T. Wang et C. J. Chen: 叶。9—16. 单蕊麻 *Droguetia iners* (Forssk.) Schweinf. subsp. *urticoides* (Wight) Friis et Wilmot-Dear, 9. 植株, 10. 茎顶部腋生的两性团伞花序, 11. 雄花, 雄蕊尚未展开, 12. 同 11, 雄蕊已展开, 花药脱落, 13. 雌花, 14. 茎顶部两性花序之下腋生 5 个雌团伞花序, 15. 同 14, 1 个雄团伞花序放大, 只含一朵花。(刘春荣绘)