

2. 叶上面无毛或近无毛，下面被银白色或雪白色毡毛，毛被把叶下面完全遮住。
6. 叶下面被银色有闪光的毡毛；雌团伞花序苞片无刺状分枝；雄花四基数。
7. 小枝被短伏毛或混生少数开展的毛；叶边缘每侧有4—12齿；雄花被片顶端无角状尖头……
- 3. 美叶雾水葛 *P. calophylla* W. T. Wang et C. J. Chen
7. 小枝密被开展的短柔毛；叶边缘每侧有15—37齿；雄花被片顶端有角状尖头
- 4. 银叶雾水葛 *P. argenteonitida* W. T. Wang
6. 叶下面被无闪光的雪白色毡毛；雌团伞花序有具刺状分枝的苞片；雄花三基数
- 6. 雪毡雾水葛 *P. niveotomentosa* W. T. Wang
1. 草本植物；叶边缘全缘，侧脉1（—2）对；雄花被片只在基部合生。
8. 叶互生，披针形或狭披针形，长达9厘米，侧脉1（—2）对；雄花被片椭圆形
- 7. 狹叶雾水葛 *P. angustifolia* Wight
8. 叶互生或对生，多为卵形，长达3.8厘米，侧脉1对；雄花被片长圆形
- 8. 雾水葛 *P. zeylanica* (L.) Benn.
1. 红雾水葛（中国高等植物图鉴） 红水麻、青白麻叶、大粘叶、大粘药、小粘榔、粘药根（云南），野麻公（海南） 图版80：1—4
- Pouzolzia sanguinea** (Bl.) Merr. in Journ. As. Soc. Straits, lxxxiv. spec. no. : 233. 1921; et in Contr. Arn. Arb. no. 8: 52. 1934; 中国高等植物图鉴1: 521, 图1042. 1972; 云南种子植物名录; 上册, 736. 1984; 贵州植物志4: 75. 1989. — *Urtica sanguinea* Bl. Bijdr. 501. 1825. — *U. viminea* Wall. Cat. n. 4616. 1830. — *Pouzolzia ovalis* Miq. Pl. Jungh. 1: 24. 1851; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 491. 1899; Dunn et Tutcher in Kew Bull. add. ser. 10: 250. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 153. 1929 — *P. viminea* (Wall.) Wedd. in DC. Prodr. 16 (1): 228. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 581. 1888; 海南植物志2: 416, 图496. 1965.

1a. 红雾水葛（原变种）

P. sanguinea (Bl.) Merr. var. **sanguinea**

灌木，高0.5—3米；小枝有浅纵沟，密或疏被贴伏或开展的短糙毛，偶尔顶部有数节无叶，只生团伞花序。叶互生；叶片薄纸质或纸质，狭卵形、椭圆状卵形或卵形，稀长圆形或披针形，长2.6—11（—17）厘米，宽1.5—4（—9）厘米，顶端短渐尖至长渐尖，基部圆形、宽楔形或钝，边缘在基部之上有数小牙齿（每侧8—14（—19）个），两面均稍粗糙，均被短糙毛，毛通常贴伏，有时稍开展，在较密并贴伏时，叶下面带银灰色并有光泽，侧脉2对；叶柄长0.4—1.2（—2.5）厘米。团伞花序单性或两性，直径2—6毫米；苞片钻形或三角形，长达2.5—4毫米。雄花：花被片4，船状椭圆形，长约1.6毫米，合生至中部，顶端急尖，外面有糙毛；雄蕊4，长约2毫米，花药长0.6毫米；退化雌蕊狭倒卵形，长约0.6毫米，基部周围有白色柔毛。雌花：花被宽椭圆形或菱形，长0.8—1.2毫米，顶端约有3个小齿，外面有稍密的毛，果期长约2毫米；柱头长0.8—



图版 80 1—4. 红雾水葛 *Pouzolzia sanguinea* (Bl.) Merr. : 1. 植株一部分, 2. 雄花, 3. 雌花, 4. 瘦果。5—6. 菱叶雾水葛 *P. elegans* var. *delavayi* (Gagnep.) W. T. Wang: 5. 植株一部分, 6. 雄花。
7—8. 雅致雾水葛 *P. elegans* Wedd.: 7. 植株一部分, 8. 雄花。(刘春荣绘)