

柱头长约3毫米，有密毛。瘦果卵球形，长约1.5毫米，白色或黑色，有光泽。花期5—9月。

自西藏东南部、云南、华南至陕西南部及河南南部广布。生于丘陵或低山林中、灌丛中、沟边草地，海拔100—1000米，在云贵高原一带可达1500—2700米。亚洲热带和亚热带地区及澳大利亚也广布。

茎皮纤维可制人造棉，供混纺或单纺。全草药用，治消化不良、食积胃痛等症，外用治血管神经性水肿、疔疮疖肿、乳腺炎、外伤出血等症。全草可饲猪。

### 3. 小叶糯米团 图版82: 1

**Gonostegia neurocarpa** (Yamamoto) Yamamoto et Masamune in Journ. Soc. Trop. Agr. 3: 392. 1931; T. S. Liu et W. D. Huang in Fl. Taiwan 2: 190. 1976. — *Memorialis neurocarpa* Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 1: 25, fig. 9. 1925.

多年生小草本；茎渐升，圆柱形，长达20厘米，自基部多分枝，被短毛，节间短，顶部节多少密集。叶对生，具短柄或无柄；叶片狭卵形或卵形，长5—12毫米，宽2—5毫米，顶端钝，基部浅心形或圆形，边缘全缘，两面无稀疏短毛或变无毛，基出脉3条，不明显；叶柄长0.5—1毫米；托叶膜质，宽卵形，长约1毫米。团伞花序腋生，两性。雄花：花梗长约1毫米；花被片(3—)4，分生，长圆形，长约1.5毫米，外面在内折线上有疏柔毛；雄蕊(3—)4；退化雌蕊极小。雌花：花被宽椭圆形或卵形，长约1毫米，顶端有毛，果期稍增大，约有12条纵肋；柱头长1—2毫米。瘦果狭卵球形，长约1毫米，黑色，有光泽。花期4—6月。

产台湾。


### 4. 台湾糯米团

**Gonostegia matsudai** (Yamamoto) Yamamoto et Masamune in Journ. Soc. Trop. Agr. 3: 392. 1931; T. S. Liu et W. D. Huang in Fl. Taiwan 2: 189. 1976. — *Memorialis matsudai* Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 1: 23, f. 8. 1925.

亚灌木，高约25毫米，多分枝；小枝对生，圆柱形，细，密被糙毛，节间短。叶对生，具短柄或近无柄；叶片卵状长椭圆形，长4—6毫米，宽2—3毫米，顶端钝或微尖，基部圆形或截形，边缘全缘，两面无短糙毛，基出脉3条，上面下陷，下面隆起；托叶宽卵形，长约1.5毫米。团伞花序两性，有少数花；苞片卵形，长约0.6毫米。雄花：花梗长约0.5毫米，无毛；花蕾沿内折线上有疏柔毛；花被片4，长圆形，长约1.1毫米；雄蕊4；退化雄蕊极小。雌花：花被果期卵形，长约1毫米，有10条纵肋；柱头长约0.8毫米。瘦果狭卵球形，长约1毫米，淡褐色。花期5—7月。

产台湾。

亚族2. 肉被麻亚族 Subtrib. Sarcoclamydinae Wedd.



图版 82 1. 小叶糯米团 *Gonostegia neurocarpa* (Yamamoto) Yamamoto et Masamune. 植株一部分, 2—7. 糯米团 *G. hirta* (Bl.) Miq., 2. 雌株一部分, 3. 雌花, 4. 叶及腋生雄团伞花序, 5. 雄花蕾, 6. 雄花, 雄蕊未展开, 7. 同 6, 雄蕊展开. 8—9. 狭叶糯米团 *G. pentandra* (Roxb.) Miq. var. *hypericifolia* (Bl.) Masamune: 8. 植株一部分, 9. 瘦果及宿存花被. (刘春荣绘)