

梗紫麻 *O. frutescens* (Thunb.) Miq. subsp. *insignis* C. J. Chen 不同。花期 4—5 月，果期 7—11 月。

产云南西部至西藏南部。生于海拔 (850—) 1 400—2 500 米山谷林中。锡金、不丹、印度北部也有。模式标本采自云南临沧。

10. 广西紫麻 (广西植物名录) 图版 85: 4—5

Oreocnide kwangsiensis Hand.-Mazz. in *Sinensia* 2: 2. 1931; 中国高等植物图鉴, 补编 1: 209. 1982.


灌木, 高 1—1.5 (—3) 米, 除叶柄、托叶背面和花序疏被极细的微糙毛外, 其余无毛; 小枝多曲折, 黑色微带光泽, 皮孔小, 宽椭圆形或近圆形。叶坚纸质, 狭椭圆形至椭圆状披针形, 长 2—11 厘米, 宽 1—4 厘米, 先端钝渐尖至短尾状渐尖, 基部宽楔形或近圆形, 边缘全缘或在上部有极不明显的数枚圆齿, 上面深绿色或蓝绿色, 下面成绿或浅蓝绿色, 两面光滑, 基出脉 3, 其侧出的一对, 弧曲, 伸达近先端, 侧脉不明显, 2—3 对, 从叶的上部伸出, 外向二级脉在近边缘处被网结; 叶柄长 0.5—2 厘米; 托叶披针形, 长 3—4 毫米, 背面中肋疏生微粗毛。雌花序生当年生枝、上年生枝和老枝上的叶腋, 常 3 回二歧分枝, 长 0.5—0.8 厘米, 团伞花簇常由 3—5 朵花组成, 径 3—4 毫米。雄花无梗, 径约 1 毫米, 花被片 3, 裂片卵形, 外面 (尤先端) 有微粗毛; 雄蕊 3; 退化雌蕊棒状。雌花圆锥状, 长约 1.5 毫米, 基部膨大, 上部渐狭。果干时变黑色, 核果状, 圆锥形, 长 1.5—2 毫米, 内果皮骨质, 两侧有明显的棱, 基部截形, 从底面观为四瓣梅花形, 宿存花被疏被微毛; 肉质花托壳斗状, 肥厚, 围以果的中下部。花期 10 月至翌年 3 月, 果期 5—10 月。

特产广西西部。散生于海拔约 800 米石灰岩疏林中或灌丛中。模式标本采自凌云。

21. 水麻属 *Debregeasia* Gaudich.

Gaudich. Bot. Voy. Bonite t. 90. 1847—48; Wedd. Monogr. Urtic. 459. 1857; et in DC. Prodr. 16 (1): 235²⁵. 1869; Wilmot-Dear in Kew Bull. 43: 673—692. 1988.; C. J. Chen in Novon 1: 56—57. 1991.

灌木或小乔木, 无刺毛。叶互生, 具柄, 边缘具细牙齿或细锯齿, 基出 3 脉, 下面被白色或灰白色毡毛, 钟乳体点状; 托叶干膜质, 柄内合生, 顶端 2 裂, 不久脱落。花单性, 雌雄同株或异株, 雄的团伞花簇常由 10 余朵花组成, 雌的球形, 多数花组成, 着生于每分枝的顶端, 花序二歧聚伞状分枝或二歧分枝, 稀单生, 成对生于叶腋。雄花: 花被片 3—4 (—5), 镊合状排列; 雄蕊 3—4 (—5); 退化雌蕊常倒卵形, 在基部围以白绵毛。雌花: 花被合生成管状, 顶端紧缩, 有 3—4 齿, 包被着子房, 果时膜质与果实离生, 或增厚变肉质, 贴生于果实; 柱头画笔头状, 具帚刷状的长毛柱头组织, 宿存。瘦果浆



图版 85 1—3. 细齿紫麻 *Oreocnide serrulata* C. J. Chen: 1. 花枝, 2. 雄花, 3. 瘦果。4—5. 广西紫麻 *O. kwangsiensis* Hand. -Mazz.: 4. 花枝, 5. 瘦果。6. 倒卵叶紫麻 *O. obovata* (C. H. Wright) Merr. var. *obovata*: 花枝及叶片下面局部放大。7. 凸尖紫麻 (变种) *O. obovata* (C. H. Wright) Merr. var. *mucronata* C. J. Chen: 花枝及叶片下面局部放大。8. 凹尖紫麻 (变种) *O. obovata* (C. H. Wright) Merr. var. *paradoxa* (Gagnep.) C. J. Chen: 花枝及叶片下面局部放大。(张春芳绘)