

面平坦，脉上被短柔毛；叶柄扁，长1—4.5厘米，密被雪白色毡毛。花单性，花序聚伞状，腋生，长与叶柄近等；团伞花序由数朵花组成，疏松排列于花枝上；花序梗长可达10毫米，密生短柔毛；苞片椭圆状匙形，先端锐尖。瘦果卵状椭圆形，外面密被毛。

花期5—7月。

产台湾兰屿。生于低海拔地区灌丛中。菲律宾和日本琉球群岛也有分布。

我们未见到本种的标本，文中记载摘自《台湾植物志》。

在《台湾植物志》中绘的本种图，其中图3—5雌花与果很明显不属于本属的特征，而可能为苘麻属的征状。故引起我们下面的怀疑，产于台湾的这群植物鉴定是否正确，抑或是绘图上的错误，有待今后进一步研究。

族 4. 墙草族 Trib. Parietarieae Wedd.

Wedd. Monogr. Urtic. 502. 1856, et in DC. Prodr. 16 (1): 235⁴¹.
1869.

草本，无刺毛；叶互生，具点状钟乳体；花杂性；雄花4数；雌花花被片(3—)4，多少合生成管状，在果时干燥，与果分生；雌花和两性花具萼状苞片；柱头常画笔头状。5属，我国有1属。

24. 墙草属 *Parietaria* L.

L. Sp. Pl. 1052. 1753; Wedd. Monogr. Urtic. 502. 1856; et in
DC. Prodr. 16 (1): 235⁴¹. 1869. — Freirea Gaudich. Voyage
monde, Uranie Physicienne Bot. 502. 1830 (“1826”).

草本，稀亚灌木。叶互生，全缘，具基出3脉或离基3出脉，钟乳体点状；托叶缺。聚伞花序腋生，常有少数几朵花组成，具短梗或无梗；苞片萼状，条形。花杂性，两性花：花被片4深裂，镊合状排列；雄蕊4。雄花：花被片4；雄蕊4。雌花：花被片4，合生成管状，4浅裂；子房直立；花柱短或无；柱头画笔头状或匙形；退化雄蕊不存在。瘦果卵形，稍压扁，果皮壳质，有光泽，包藏于宿存的花被内。种子具胚乳，子叶长圆状卵形。染色体基数 $x=7, 8, 10, 13, 14$ 。

约20种，分布温带和亚热带地区。我国有1种，产除华东与华南地区外的省区。

1. 墙草 (中国科属检索表) 图版 87: 1—5

Parietaria micrantha Ledeb. Ic. Pl. Ross. Alt. 1: 7, t. 22. 1829; A. Jarmolenko in Kom. Fl. URSS 5: 402, t. 22, fig. 4. 1936; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 171. 1939; 东北草本植物志 2: 7, 图 6. 1959; 中国高等植物图鉴 1: 525, 图 1049. 1972; 秦岭植物志 1 (2): 116, 图 98. 1974; 湖北植物志 1: 183, 图 241. 1976. Grierson et Long,