

植物志 1:32, pl. 10, 1. 1977.

乔木,高6—10米,树皮暗褐色;芽被锈色短柔毛,小枝和成长叶均无毛。叶坚纸质或近革质,长圆状披针形或倒卵状长圆形,长11—18厘米,顶端急尖或短渐尖,基部楔形,全缘或边缘具疏生细锯齿;中脉和8—9(—11)对侧脉在两面均隆起或凸起,网脉两面均明显;叶柄长1—2厘米。总状花序,1—2个腋生或生于小枝顶部叶腋,长12—15厘米,花序轴被短柔毛,毛逐渐脱落;花梗长3—4毫米;苞片卵形,长约1毫米,具缘毛;小苞片长不及0.5毫米;花被管长12—15毫米,白色,无毛;花药长2—3毫米;花盘4裂;子房无毛。果扁球形,直径约3厘米,果皮干后树皮质,厚1.5毫米。花期2—4月,果期6—7月。

产于云南西南部。生于海拔1400—1950(—2100)米山地湿润阔叶林中。模式标本采自潞西。

9. 西藏山龙眼(植物分类学报)

Helicia tibetensis H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. 18: 524. 1980; 西藏植物志 1:566, pl. 181, 1—4. 1983.

乔木,高(8—)15—20(—30)米;嫩芽被暗褐色柔毛,毛全脱落,小枝和叶均无毛。叶坚纸质,长倒卵形或倒卵状长圆形,长22—25厘米,宽6.5—10厘米,顶端骤渐尖,基部楔形,上半部边缘具疏细齿;中脉在下面隆起,侧脉7—9对,在下面凸起,网脉两面均明显;叶柄长1—2厘米。总状花序生于小枝已落叶腋部或腋生,长(15—)24—30厘米,花序轴和花梗均被疏柔毛,花梗双生,长6—7毫米,下半部彼此贴生;苞片披针形,长约2毫米,被疏毛;小苞片线形,长0.5—1毫米;花被管长16—18毫米,浅黄色;花药长约3毫米;腺体4枚,卵球形;子房无毛。果近球形,绿色,直径约3厘米,顶端具短尖,基部骤狭呈短柄状,果皮干后树皮质,厚1—1.5毫米,灰色,具颗粒状体。花果期5—9月。

产于西藏(墨脱)、云南(腾冲)。生于海拔1720—2000米山地常绿阔叶林中。模式标本采自西藏墨脱。

10. 东兴山龙眼(新拟)

Helicia cauliflora Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 24. 1938; Sleum. in Blumea 8: 73. 1955.

小乔木,高5—8米,树皮褐色。叶革质,披针形或长圆状披针形,长(8—)10—20厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖,基部楔形,稍下延,叶缘具缘,全缘,稀具疏生细锯齿,无毛;中脉在上面稍凹下,侧脉7—10对,几乎出,远距边缘向上弯拱联结;叶柄长1—2厘米。总状花序生于已落叶的枝上,长12—15厘米,被贴生褐色短柔毛;花梗常双生,长4—7毫米;苞片钻状,长1毫米;花被管长30—35毫米,白色;腺体4枚,卵球形;子房无毛。果卵球形,长2.5厘米,直径约2厘米,顶端具喙或无喙,基部骤狭呈柄状,果皮干后树皮质,厚约1毫米,淡褐色。花期5—10月,果期10月至翌年3月。

产于广西(防城)。生于海拔150—450米山谷或溪畔湿润疏林中。越南北部也有分