

长6—8毫米,宽2.5—3毫米,白色或淡黄色,先端有4—5枚三角形的小裂齿,裂齿不反卷,雄蕊着生在花冠管上,花冠内面着生雄蕊处的下部各有一束短毛;子房半下位,半埋在花盘中,下部3室、上部1室,每室具胚珠1枚,柱头通常不伸出花冠管外。果近球形,直径7—9(—12)毫米,成熟时几全部为增大的花萼筒所包围,增大的花萼筒外部黄色,基部为杯状的副萼所承托。花期9—10月,果期10月至翌年1月。

产云南(南部、西南部)及西藏(东南部);生于海拔850—2100米密林、疏林或灌丛中。印度、尼泊尔、不丹、锡金、孟加拉、缅甸、泰国、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚(苏门答腊)等都有。模式标本采自尼泊尔。

根入药,治骨折;种子榨油,供工业用。

组 2. 青皮木组——Sect. *Schoepfiopsis* (Miers) Engl. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. **3**(1): 146. 1897; Sleum. in Engl. u. Prantl. Nat. Pflanzenfam. **16b**: 31. 1935, et in *Blumea* **26**(1): 161. 1980; Van Steen. in *Reinwardtia* **1**: 468. 1952 ——*Schoepfiopsis* Miers, in Journ. Linn. Soc. Bot. **17**: 75. 1878 p. p.; Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. **43**: 551. 1896.

花无梗,排成穗状花序式的螺旋状聚伞花序,或数朵集生成短穗状或近似头状花序式的螺旋状聚伞花序,有时花单生,花序基部无苞片;花无副萼,基部苞片与缩短的花梗合生成略为膨大的“基座”,基座小,边缘有一小裂齿。

模式种: 青皮木 *Schoepfia jasminodora* Sieb. et Zucc.

2. 青皮木(中国树木分类学) 幌幌木、素馨地锦树(中国树木分类学), 羊脆骨(云南)

Schoepfia jasminodora Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Wiss. Münch. **4**(3): 135. 1846; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**: 114. 1886; Diels. in Not. Bot. Gard. Edinb. **7**: 30, 92. 1912; Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 321. 1916; Chun in *Sunyatsenia* **1**: 227. 1934; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1371. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 251, 图185, 1937; Ohwi, Fl. Jap. 395. 1965; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **27**: 272. 1967; 中国高等植物图鉴 **1**: 529, 图 1057. 1972; H. L. Li et al. Fl. Taiwan **6**: 34. 1979; Sleum. in *Blumea* **26**(1): 161. 1980. excl. syn. *S. chinensis* Sleum., non Gardn. et Champ.; 林有润, 植物研究 **2**(4): 20. 1982. ——*Schoepfiopsis jasminodora* (Sieb. et Zucc.) Miers, in Journ. Linn. Soc. Bot. **17**: 77. 1878. ——*Vaccinium cavaleriei* Lévl. et Van. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 447. 1911; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 154. 1914.

2a. 青皮木(原变种)

S. jasminodora Sieb. et Zucc. var. *jasminodora*

落叶小乔木或灌木,高3—14米;树皮灰褐色;具短枝,新枝自去年生短枝上抽出,嫩