

1830.——*Henslowia heterantha*(Wall. ex DC.) Hook. f. et Thoms. ex A. DC. Prodr. **14**: 632. 1857.

木质藤本,高约2米;枝直立或缠绕,小枝初时多少4棱,粗糙,通常有疏密不等的小疣瘤和纵长形的皮孔,老时圆柱状,具纵纹。叶形变化较大,通常呈椭圆状卵形或倒卵状椭圆形,长2—2.7厘米,宽1.3—1.7(—2)厘米,顶端圆钝,中部以下骤收狭而下延成叶柄,边缘明显翻折,上面有光泽,两面多少有小疣瘤,基出脉7—9条,在背面常不明显;叶柄短而扁,有狭翅,或近无柄。花卵圆形,长1.8毫米,无柄,单生或簇生;总花梗长3—6毫米,基部有苞片,顶端有小苞片;苞片阔卵形,小苞片椭圆形,微小,常数片连合呈总苞状;雄花:5—6朵簇生;雌花:单生或3—4朵聚生,偶见退化雄蕊,花柱极短,柱头浅5裂。核果红色或橙黄色,橢圆状至近球形,直径约4毫米,宿存花被裂片三角形,顶端内弯。果期8—10月。

产于云南(西北部)。在海拔2000—3700米山地阔叶林中,寄生于栎属植物的枝上。尼泊尔、锡金、缅甸、马来西亚(西部)也有分布。模式标本采自尼泊尔。我国分布新记录。

2. 疣枝寄生藤(新拟)

Dendrotrophe granulata (Hook. f. et Thoms. ex A. DC.) A. N. Henry et B. Roy in Bull. Bot. Surv. Ind. **10**: 276. 1969.——*Henslowia granulata* Hook. f. et Thoms. ex A. DC. in Prodr. **14**: 632. 1857; Hook. f. in Fl. Brit. Ind. **5**: 232. 1886, '*Henslowia*'.

木质藤本,枝直立,通常灰白褐色,密被小疣瘤和粗糙的皮孔;小枝圆柱状,密被颗粒状的泡状突起。叶阔卵形,长3—4.5厘米,宽1.6—4厘米,顶端钝或近圆形,基部阔楔形或近圆形,常歪斜,急收缩而成明显的叶柄,边缘背卷,上面有光泽,背面苍绿色,暗晦,干后两面褐色,密被小泡状突起,基出脉5—7条,网脉隐约可见;叶柄扁平,有狭翅。花卵圆形,无梗,单性;雄花簇生或集成伞形花序;雌花:单生或成对着生;总花梗长4毫米,有棱;苞片长1毫米,卵形或阔卵形,多少被缘毛;小苞片卵形,4—5枚,较苞片小,呈总苞状;花被5裂,顶端内弯;雌花的花柱短或不存在,柱头不明显分裂。核果卵圆形,长4—6毫米,成熟时红褐色;宿存花被微小。花果期5—8月。

产于西藏(墨脱)。生于海拔1800米山坡栎林中。锡金、不丹、尼泊尔、印度(东北部)也有分布。模式标本采自喜马拉雅山区。

3. 多脉寄生藤(中国高等植物图鉴) 图版 18: 7—10

Dendrotrophe polyneura (Hu) D. D. Tao, in Index Fl. Yunnan. **1**: 774. 1984.——*Henslowia polyneura* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. **10**(3): 157. 1940; 中国高等植物图鉴 **1**, 532 图 1064. 1972.

木质藤本;枝长约30—40厘米;小枝圆柱状,有条纹,有泡状小疣瘤,老时尤密。叶纸质,叶形多样,通常倒卵形至近圆形,长2—4.5厘米,宽2—3.5厘米,顶端圆钝,向基部收狭并下延,边缘软骨质,微皱波状,基出脉7—9条,在两面稍隆起;叶柄扁阔,长5—7毫