

1922.

灌木,高 0.5—1 米,全株无毛;小枝灰色,具散生皮孔。叶革质,长卵形至披针形,长 (1—5)10—11 厘米,宽 (1.5—)4—4.5 厘米,顶端长渐尖或渐尖,基部楔形;中脉在上面扁平,在下面凸起,侧脉 4—5 对,不明显;叶柄长 3—7 毫米。总状花序,1—3 个腋生或生于小枝已落叶腋部,花序梗长 3—5 毫米,具花 2—4(—8) 朵,花梗长约 1 毫米,若 2 朵花时,着生于花序梗顶部,花梗几无;苞片近圆形或三角形,顶端钝或急尖;小苞片 2 枚,合生,阔卵形,长约 1.5 毫米,顶端微缺;花托椭圆形,长 3 毫米,直径 1.5 毫米;副萼环状,长约 0.7 毫米;花冠浅黄色,长 1.1—1.2 厘米,冠管膨胀,具六钝棱,裂片 6 枚,披针形,长 6 毫米,反折;花丝长 5 毫米,花药长 1—1.2 毫米,花柱线状,柱头头状。果椭圆形,长 7 毫米,直径约 5.5 毫米,黄色,花柱基稍突起,果皮具小疣。花期 4—5 月,果期 5—6 月。

产于云南勐腊。海拔 700 米常绿阔叶林中,寄生于木兰科山白兰上。新几内亚西北部和东北部也有分布。模式标本采自新几内亚岛。

本种的枝叶外形与鞘花 *M. cochinchinensis* 近似,但区别是本种具有花梗短或几无等特征。


3. 双花鞘花(海南植物志) 图版 21: 1—7

Macrosolen bibracteolatus (Hance) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, 10: 343. 1929, op. cit. 16: 8. 1938; 云南植物志 3: 350. 1983. — *Loranthus bibracteolatus* Hance in Journ. Bot. 18: 301. 1880; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 405. 1894. — *Elytranthe bibracteolata* (Hance) Lecomte in Sargent, Pl. Wils. 3: 317. 1916; 海南植物志 2: 463. 1965. — *E. bibracteolata* var. *sinensis* Lecomte in l. c. — *E. bibracteolata* var. *acuminatissima* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 68. 1927.

灌木,高 0.3—1 米,全株无毛;小枝灰色。叶革质,卵形、卵状长圆形或披针形,长 8—12 厘米,宽 2—5 厘米,顶端渐尖或长渐尖,稀略钝,基部楔形;中脉两面均凸起,侧脉两面明显或不明显;叶柄短,长 2(—5) 毫米。伞形花序,1—4 个腋生或生于小枝已落叶腋部,具花 2 朵,总花梗长约 4 毫米;花梗长 4 毫米;苞片半圆形,长约 1 毫米;小苞片 2 枚,合生,近圆形,长 1 毫米;花托圆柱状,长约 4 毫米;副萼杯状,长 1.5 毫米;花冠红色,长 3.2—3.5 厘米,冠管下半部膨胀,喉部具 6 棱,裂片 6 枚,披针形,长约 1.4 厘米,反折,青色;花丝长 7—8 毫米,花药长 3 毫米;花柱线状,近基部具关节,柱头头状。果长椭圆形,长约 9 毫米,直径 7 毫米,红色,果皮平滑,宿存花柱基喙状,长约 1.5 毫米。花期 11—12 月,果期 12 月至翌年 4 月。

产于云南西南部和南部、贵州东南部、广西、广东。海拔 300—1800 米山地常绿阔叶林中,寄生于樟属、山茶属、五月茶属、灰木属等植物上。越南北部、缅甸也有分布。模式标本采自广东英德。

4. 短序鞘花(新拟)



1—7. 双花桐花 *Macrosolen bibracteolatus* (Hance) Danser: 1.花枝; 2. 花萼; 3. 花序和花; 4. 苞片; 5. 合生的2枚小苞片; 6 果; 7. 果顶部, 示副萼及喙状花柱基。8—14. 大苞桐花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume: 8.花枝; 9. 幼花序; 10—11. 苞片; 12 花萼; 13. 开放的花; 14. 花托及钟状副萼。(余汉平绘)