

Macrosolen robinsonii (Gamble) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 345. 1929, op. cit. **11**: 297, f. 5, i. 1931, op. cit. **16**: 7. 1938, et in Blumea **2**: 43. 1936. — *Elytranthe robinsonii* Gamble in Kew Bull. **1913**: 45. 1913.

灌木, 高 0.5—1 米, 全株无毛; 小枝灰色, 具疏生皮孔。叶革质, 椭圆形至披针形, 长 (4—) 7—9 厘米, 宽 (1.5—) 2—3 厘米, 顶端渐尖或圆钝, 基部楔形; 中脉两面均凸起, 侧脉在上面略明显; 叶柄长 2—4 毫米。伞形花序, 通常 2 个生于小枝已落叶腋部或腋生, 具花 2—3 朵, 总花梗长 1 (—2.5) 毫米; 花梗长 1—2 毫米; 苞片卵形, 长约 1 毫米; 小苞片 2 枚, 近卵形, 长约 1 毫米, 大部分合生; 花托椭圆状, 长约 2 毫米; 副萼环状, 边缘波状; 花冠橙红色或黄色, 长 1.1—1.5 厘米, 花蕾时上半部棒状, 中部具六棱, 下半部膨胀, 裂片 6 枚, 披针形, 长 5—7 毫米, 反折; 花丝长约 3 毫米, 花药长 1—1.5 毫米; 花柱线状, 柱头头状。成熟果未见。 花期 4—9 月。

产于云南(腾冲、龙陵、景洪)。海拔 1000—1850 (—2500) 米山地常绿阔叶林中, 寄生于栎属植物上。马来西亚、越南南部也有分布。模式标本采自马来西亚。

5. 三色鞘花(海南植物志)

Macrosolen tricolor (Lecomte) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **10**: 346. 1929, op. cit. **16**: 14. 1938; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 216. 1982. — *Elytranthe tricolor* Lecomte, Not. Syst. **3**: 94. 1914; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 69. 1927; 海南植物志 **2**: 463. 1965; 中国高等植物图鉴 **1**: 537, 图 1073. 1972.

灌木, 高约 0.5 米, 全株无毛; 小枝灰色, 具皮孔。叶革质, 倒卵形至狭倒卵形, 长 3.5—5.5 厘米, 宽 1.3—2 厘米, 顶端圆钝, 基部楔形, 稍下延, 具基出脉 3—5 条; 叶柄长 2—3 毫米。伞形花序, 1—2 个腋生, 稀于小枝已落叶腋部, 总花梗长约 1 毫米, 具花 2 朵; 花梗长 1 毫米; 苞片半圆形, 长约 1 毫米; 小苞片 2 枚, 合生, 呈近半圆形, 长约 1 毫米; 花托椭圆状, 长 2.5—3 毫米; 副萼环状, 长 1 毫米; 花冠长 2.5—3.5 厘米, 冠管红色, 稍弯, 喉部具六棱, 裂片 6 枚, 青色, 披针形, 长 6—9 毫米, 反折; 花丝长 3—4 毫米, 花药长 2—3 毫米; 花柱线状, 柱头头状。果球形, 紫黑色, 长约 7 毫米, 果皮平滑。 花果期 8 月至翌年 3 月。

产于广西(防城、北海市)、广东海南岛和雷州半岛。海滨平原或低海拔山地灌木林中, 寄生于香叶树、桔树、银柴、龙眼、红花榄李等植物上。越南、老挝也有分布。模式标本采自越南北部。

2. 大苞鞘花属——*Elytranthe* Blume

Blume in Schult. Syst. Veg. **7**: 1611, 1730. 1830; Danser in Verhand.

Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, **29**(6): 15, 50. 1933.

寄生性灌木。叶对生,革质,侧脉羽状;具叶柄。穗状花序,腋生,花交叉对生,密集,花序轴在花着生处具凹穴;每朵花具1枚苞片和2枚小苞片,包围花托基部或包围花托及花冠管的基部;花两性,6数,花托卵球形或圆柱状,基部下陷于花序轴凹穴;副萼环状或杯状;花冠在成长的花蕾时管状,冠管膨胀,中部稍具六棱或无棱,开花时顶部分裂,裂片6枚,反折或稍扭曲;雄蕊6枚,花丝长的,花药基着,4室,纵裂,药室有时具横隔;子房初3室,稍后变为一室,特立中央胎座,胎座基部3裂,花柱线状,近基部具关节,柱头头状。浆果球形或椭圆状,顶端具宿存副萼及乳头状或喙状花柱基;种子1颗。

模式种: 大苞鞘花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume

约10种,分布于亚洲南部和东南部。我国产2种,分布于云南和西藏。

分 种 检 索 表

1. 叶的侧脉两面稍明显,苞片和小苞片长于花托,花冠长6—7厘米……………1. 大苞鞘花 *E. albida* (Blume) Blume
1. 叶的侧脉两面均不明显,苞片和小苞片短于花托,花冠长4.5—5厘米……………2. 墨脱大苞鞘花 *E. parasitica* (L.) Danser

组 1. 大苞鞘花组——Sect. *Elytranthe*——*Elytranthe* Blume Sect. *Cocloma* (Danser) Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2. **16** b: 143. 1935.——*Elytranthe* Blume Subgen. *Coeloma* Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, **29** (6): 15. 1933.

穗状花序具总花梗,苞片和小苞片均长于花托并包围花托;花冠管下半部稍膨胀,在花丝着生处之下骤收缩的;花药的药室无横隔。

组模式种: 大苞鞘花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume

本组我国产1种。

1. 大苞鞘花(云南植物志) 图版 21: 8—14

Elytranthe albida (Blume) Blume in Schult. Syst. Veg. **7**: 1611. 1830; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **11**: 305. 1931, op. cit. **16**: 15. 1938, et in Blumea **2**: 43. 1936; 云南植物志 **3**: 352 pl. 101, 3—5. 1983.——*Loranthus albidus* Blume in Verhand. Batav. Genootsch. **9**: 184. 1823.——*Elytranthe henryi* Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 318. 1916.

灌木,高2—3米,全株无毛;枝条披散,老枝灰色,粗糙。叶革质,长椭圆形至长卵形,