

Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, **29**(6): 15, 50. 1933.

寄生性灌木。叶对生,革质,侧脉羽状;具叶柄。穗状花序,腋生,花交叉对生,密集,花序轴在花着生处具凹穴;每朵花具1枚苞片和2枚小苞片,包围花托基部或包围花托及花冠管的基部;花两性,6数,花托卵球形或圆柱状,基部下陷于花序轴凹穴;副萼环状或杯状;花冠在成长的花蕾时管状,冠管膨胀,中部稍具六棱或无棱,开花时顶部分裂,裂片6枚,反折或稍扭曲;雄蕊6枚,花丝长的,花药基着,4室,纵裂,药室有时具横隔;子房初3室,稍后变为一室,特立中央胎座,胎座基部3裂,花柱线状,近基部具关节,柱头头状。浆果球形或椭圆状,顶端具宿存副萼及乳头状或喙状花柱基;种子1颗。

模式种: 大苞鞘花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume

约10种,分布于亚洲南部和东南部。我国产2种,分布于云南和西藏。

分 种 检 索 表

1. 叶的侧脉两面稍明显,苞片和小苞片长于花托,花冠长6—7厘米……………1. 大苞鞘花 *E. albida* (Blume) Blume
1. 叶的侧脉两面均不明显,苞片和小苞片短于花托,花冠长4.5—5厘米……………2. 墨脱大苞鞘花 *E. parasitica* (L.) Danser

组1. 大苞鞘花组——Sect. *Elytranthe*——*Elytranthe* Blume Sect. *Cocloma* (Danser) Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2. **16** b: 143. 1935.——*Elytranthe* Blume Subgen. *Coeloma* Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, **29** (6): 15. 1933.

穗状花序具总花梗,苞片和小苞片均长于花托并包围花托;花冠管下半部稍膨胀,在花丝着生处之下骤收缩的;花药的药室无横隔。

组模式种: 大苞鞘花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume

本组我国产1种。

1. 大苞鞘花(云南植物志) 图版 21: 8—14

Elytranthe albida (Blume) Blume in Schult. Syst. Veg. **7**: 1611. 1830; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. 3, **11**: 305. 1931, op. cit. **16**: 15. 1938, et in Blumea **2**: 43. 1936; 云南植物志 **3**: 352 pl. 101, 3—5. 1983.——*Loranthus albidus* Blume in Verhand. Batav. Genootsch. **9**: 184. 1823.——*Elytranthe henryi* Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 318. 1916.

灌木,高2—3米,全株无毛;枝条披散,老枝灰色,粗糙。叶革质,长椭圆形至长卵形,

长 8—16 厘米,宽 4.5—6 厘米,顶端短尖,基部圆钝;侧脉稍明显;叶柄长 2—3 厘米。穗状花序,1—3 个生于老枝已落叶腋部或生于叶腋,具花 2—4 朵,总花梗长约 1 厘米,粗 3 毫米,稍扁平,基部具 2—3 对鳞片;苞片卵形,长 6—10 毫米,宽 4—6 毫米,顶端急尖,具脊棱;小苞片长卵形,长 8—12 毫米,宽 5—7 毫米,顶端钝尖,具脊棱;花托长卵状,长约 2 毫米;副萼杯状,长 1—1.5 毫米,全缘;花冠红色,长 6—7 厘米,冠管下半部稍膨胀,上半部具六浅棱,裂片 6 枚,披针形,长约 2 厘米,反折;花丝长 8—10 毫米,花药长 4.5—6 毫米。果球形,长约 3 毫米,顶端具宿存副萼和乳头状花柱基。花期 11 月至翌年 4 月。

产于云南西南部、南部和东南部。海拔 1000—1800(—2300)米山地常绿阔叶林中,寄生于栎属、榕属等植物上。缅甸、泰国、老挝、越南、马来西亚、印度尼西亚也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

组 2. 圆形苞片组——Sect. *Blumella* (Van Tiegh.) Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 16 b: 143. 1935.——*Blumella* Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42: 441. 1895, pro parte——*Elytranthe* Blume Subgen. *Blumella* (Van Tiegh.) Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, 29 (6): 16. 1933.

穗状花序具总花梗,苞片和小苞片近圆形,短于花托,包围花托基部;花冠管上半部稍膨胀,冠管不收缩;花药的药室具横隔,形成多数小药室。


模式种: 墨脱大苞鞘花 *Elytranthe parasitica* (L.) Danser

本组我国产 1 种。

2. 墨脱大苞鞘花(新拟)

Elytranthe parasitica (L.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 10: 315. 1929; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 16 b: 143. 1935; 丘华兴、广西植物 6: 42, 1986——*Lonicera parasitica* L. Sp. Pl. 175. 1753.——*Loranthus lonicerioides* L. Sp. Pl. ed. 2, 1: 473. 1762 “*loniceroides*”; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 221. 1886.——*L. loniceroides* Burm. Fl. Ind. 84. 1768.——*Elytranthe loniceroides* (L.) G. Don, Gen. Hist. 3: 427. 1834.

灌木,高 1—2 米,全株无毛;枝条粗壮,老枝灰色,粗糙,具瘤体。叶革质,椭圆形、长卵形至披针形,长 8—10 厘米,宽 3—5 厘米,顶端短渐尖或急尖,基部阔楔形或楔形,具叶缘;中脉在上面扁平,在下面凸起,侧脉两面均不明显;叶柄长 8—12 毫米。穗状花序,1—2 个生于老枝已落叶腋部或腋生,具花 2—6 朵,总花梗长 5—8 毫米,粗 2—2.5 毫米,圆柱状,基部具 2—3 对鳞片,苞片近圆形,长约 2 毫米,宽约 3 毫米,顶端细尖,具脊棱;小苞片近圆形,长约 2 毫米,宽约 2 毫米,具脊棱;花托圆柱状,长约 4 毫米,直径约 2.5 毫米;副萼杯状,长约 1 毫米,近全缘;花冠红色,长 4.5—5 厘米,冠管上半部稍膨胀,裂片 6 枚,披针



1—7. 双花桐花 *Macrosolen bibracteolatus* (Hance) Danser: 1.花枝; 2. 花萼; 3. 花序和花; 4. 苞片; 5. 合生的2枚小苞片; 6 果; 7. 果顶部, 示副萼及喙状花柱基。8—14. 大苞桐花 *Elytranthe albida* (Blume) Blume: 8.花枝; 9. 幼花序; 10—11. 苞片; 12 花萼; 13. 开放的花; 14. 花托及钟状副萼。(余汉平绘)