

长 8—16 厘米,宽 4.5—6 厘米,顶端短尖,基部圆钝;侧脉稍明显;叶柄长 2—3 厘米。穗状花序,1—3 个生于老枝已落叶腋部或生于叶腋,具花 2—4 朵,总花梗长约 1 厘米,粗 3 毫米,稍扁平,基部具 2—3 对鳞片;苞片卵形,长 6—10 毫米,宽 4—6 毫米,顶端急尖,具脊棱;小苞片长卵形,长 8—12 毫米,宽 5—7 毫米,顶端钝尖,具脊棱;花托长卵状,长约 2 毫米;副萼杯状,长 1—1.5 毫米,全缘;花冠红色,长 6—7 厘米,冠管下半部稍膨胀,上半部具六浅棱,裂片 6 枚,披针形,长约 2 厘米,反折;花丝长 8—10 毫米,花药长 4.5—6 毫米。果球形,长约 3 毫米,顶端具宿存副萼和乳头状花柱基。花期 11 月至翌年 4 月。

产于云南西南部、南部和东南部。海拔 1000—1800(—2300)米山地常绿阔叶林中,寄生于栎属、榕属等植物上。缅甸、泰国、老挝、越南、马来西亚、印度尼西亚也有分布。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

组 2. 圆形苞片组——Sect. *Blumella* (Van Tiegh.) Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 16 b: 143. 1935.——*Blumella* Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 42: 441. 1895, pro parte——*Elytranthe* Blume Subgen. *Blumella* (Van Tiegh.) Danser in Verhand. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam afd. Natuurk. Sect. 2, 29 (6): 16. 1933.

穗状花序具总花梗,苞片和小苞片近圆形,短于花托,包围花托基部;花冠管上半部稍膨胀,冠管不收缩;花药的药室具横隔,形成多数小药室。

模式种: 墨脱大苞鞘花 *Elytranthe parasitica* (L.) Danser

本组我国产 1 种。

2. 墨脱大苞鞘花(新拟)

Elytranthe parasitica (L.) Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 3, 10: 315. 1929; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 16 b: 143. 1935; 丘华兴、广西植物 6: 42, 1986——*Lonicera parasitica* L. Sp. Pl. 175. 1753.——*Loranthus lonicerioides* L. Sp. Pl. ed. 2, 1: 473. 1762 “*loniceroides*”; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 221. 1886. ——*L. loniceroides* Burm. Fl. Ind. 84. 1768.——*Elytranthe loniceroides* (L.) G. Don, Gen. Hist. 3: 427. 1834.

灌木,高 1—2 米,全株无毛;枝条粗壮,老枝灰色,粗糙,具瘤体。叶革质,椭圆形、长卵形至披针形,长 8—10 厘米,宽 3—5 厘米,顶端短渐尖或急尖,基部阔楔形或楔形,具叶缘;中脉在上面扁平,在下面凸起,侧脉两面均不明显;叶柄长 8—12 毫米。穗状花序,1—2 个生于老枝已落叶腋部或腋生,具花 2—6 朵,总花梗长 5—8 毫米,粗 2—2.5 毫米,圆柱状,基部具 2—3 对鳞片,苞片近圆形,长约 2 毫米,宽约 3 毫米,顶端细尖,具脊棱;小苞片近圆形,长约 2 毫米,宽约 2 毫米,具脊棱;花托圆柱状,长约 4 毫米,直径约 2.5 毫米;副萼杯状,长约 1 毫米,近全缘;花冠红色,长 4.5—5 厘米,冠管上半部稍膨胀,裂片 6 枚,披针

形,长1.8—2厘米,反折或稍扭曲;花丝长约14毫米,花药长约4.5毫米,药室具横隔。幼果椭圆状,长6毫米,直径约4毫米,顶端具宿存杯状副萼和喙状花柱基。花期2—3月。

产于西藏(墨脱)。海拔1500—1650米山谷常绿阔叶林中,寄生于阔叶树上,寄主未详。我国新纪录。印度、锡金、斯里兰卡也有分布。模式标本采自印度东部。

2. 桑寄生族——Trib. Loranthaceae

Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 1: 125. 1897;

Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 16 b:

137. 1935. pro parte

半寄生性灌木。子房1室,特立中央胎座、基生胎座或无明显胎座,数个造孢细胞生于胎座中央或子房室基部,胚囊伸长顶端达花柱的中部或顶部。浆果。

本族有2亚族:桑寄生亚族 Subtrib. Loranthinae 和新桑寄生亚族 Subtrib. Psittacanthinae Engl. (我国不产),共有41属;我国产6属。

3. 离瓣寄生属——Helixanthera Lour.

Lour. Fl. Cochinch. 142. 1790; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg

ser. 3, 10: 316. 1929, op. cit. 11: 368. 1931, op. cit. 16: 16.

1938. — *Loranthus* L. Sect. *Phoenicanthemum* Blume, Fl. Javae Loranth. 13. 1830

寄生性灌木;嫩枝,叶无毛或被毛。叶对生或互生,稀近轮生,侧脉羽状。总状花序或穗状花序,腋生,稀顶生;花两性,4—6数,辐射对称,每朵花具苞片1枚;花托卵球形至坛状;副萼环状,全缘或具4—6浅齿;花冠在花蕾时下半部通常具棱,上半部通常椭圆状,直立,花瓣离生;雄蕊通常着生于花瓣中部,花丝短,花药椭圆状,2—4室,药室具横隔或无;子房1室,基生胎座,花柱柱状,具四至六棱,通常在中部具缢痕,柱头头状或钝。浆果,顶端具宿存副萼,外果皮革质,平滑或被毛,中果皮具粘胶质;种子1颗。

模式种: 离瓣寄生 *Helixanthera parasitica* Lour.

约50种,分布于非洲和亚洲的热带和亚热带地区。我国产7种,分布于西藏、云南、贵州、广西、广东、福建等省区。

分种检索表

1. 花5数;幼枝、叶均无毛,花序具花40朵以上。