

1935. (*Viscées* Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **43**: 185. 1896.)

半寄生性灌木或亚灌木。聚伞花序或聚伞式的总状或穗状花序，腋生或顶生；花药多室，孔裂；子房1室，基生胎座。

本族有2属；我国产1属。

## 11. 槲寄生属——*Viscum* L.

L. Sp. Pl. 1023. 1753, et Gen. Pl. ed. 5, 448. 1754; Engl. in Engl.

u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. **1**: 139. 1897.——*Aspidixia* Van

Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France **43**: 191. 1896.

寄生性灌木或亚灌木；茎、枝圆柱状或扁平，具明显的节，相邻的节间互相垂直；枝对生或二歧地分枝。叶对生，具基出脉或叶退化呈鳞片状。雌雄同株或异株；聚伞式花序，顶生或腋生，通常具花3—7朵，总花梗短或无，常具2枚苞片组成的舟形总苞；花单性，小，花梗无，具苞片1—2枚或无；副萼无；花被萼片状；雄花：花托辐状；萼片通常4枚；雄蕊贴生于萼片上，花丝无，花药圆形或椭圆形，多室，药室大小不等，孔裂；雌花：花托卵球形至椭圆状；萼片4枚，稀3枚，通常花后凋落；子房1室，基生胎座，花柱短或几无，柱头乳头状或垫状。浆果近球形或卵球形或椭圆状，常具宿存花柱，外果皮平滑或具小瘤体，中果皮具粘胶质。种子1颗，胚乳肉质，胚1—3个。

模式种：白果槲寄生 *Viscum album* L.

约70种，分布于东半球，主产热带和亚热带地区，少数种类分布于温带地区。我国产11种、1变种，除新疆外，各省区均有。

本属的槲寄生、枫香槲寄生等的植株供药用。

## 分种检索表

1. 花雌雄异株；花序顶生或腋生于茎又状分枝处，无不定花芽；雌花序聚伞式穗状，具花3—5朵，雄花序聚伞状(组1. 槲寄生组 Sect. *Viscum* Engl.)。
  2. 植株具叶片。
    3. 叶片宽0.7—2.5厘米，非线形。
      4. 叶长椭圆形或椭圆状披针形，果球形，淡黄色或橙红色 ..... 1. 槲寄生 *V. coloratum* (Kom.) Nakai
      4. 叶倒卵形，果椭圆状，黄色 ..... 2b. 卵叶槲寄生 *V. album* var. *meridianum* Danser
    3. 叶片宽2—4毫米，线形，果卵球形，绿色 ..... 3. 线叶槲寄生 *V. fargesii* Lecomte
  2. 植株仅具鳞片状叶，果卵球形，黄绿色 ..... 4. 绿茎槲寄生 *V. nudum* Danser
1. 花雌雄同株；聚伞花序，腋生，偶顶生(组2. 腋花槲寄生组 Sect. *Botryoviscum* Engl.)。
  5. 聚伞花序具不定花芽，花在舟形组苞上排列成一行，植株具叶片，叶顶端急尖或渐尖，稀钝。

6. 花序具花 5—7 朵, 中央 1 朵为雄花, 侧生的为雌花, 叶椭圆形或披针形, 果椭圆状, 顶端钝…………… 5. 云南槲寄生 *V. yunnanense* H. S. Kiu
6. 花序具花 3—7 朵, 中央 1—3 朵为雌花, 侧生的为雄花。
7. 叶长卵形至披针形, 果椭圆状, 顶端截平, 基部渐狭或圆钝…………… 6. 五脉槲寄生 *V. monoicum* Roxb. ex DC.
7. 叶披针形或镰刀形, 果上半部呈倒卵球形或近球形, 下半部骤狭呈柄状…………… 7. 柄果槲寄生 *V. multinerve* (Hayata) Hayata
5. 聚伞花序无不定花芽, 具花 3 朵, 中央一朵为雌花, 侧生的为雄花, 或仅具 1 朵雌花或雄花。
8. 植株具叶片, 叶卵形、倒卵形或长椭圆形, 顶端圆钝, 果近球形, 基部骤狭呈柄状, 果皮具小瘤体…………… 8. 瘤果槲寄生 *V. ovalifolium* DC.
8. 成长植株仅具鳞片状叶。
9. 茎、枝均明显地扁平。
10. 枝的节间宽 2—3.5 毫米, 干后边缘薄, 纵肋 3 条, 果球形, 直径 3—4 毫米, 白色或青白色…………… 9. 扁枝槲寄生 *V. articulatum* Burm. f.
10. 枝的节间宽 4—8 毫米, 干后边缘肥厚, 纵肋 5—7 条, 果椭圆状, 有时卵球形, 长 5—7 毫米, 橙红色或黄色…………… 10. 枫香槲寄生 *V. liquidambaricolum* Hayata
9. 茎近圆柱状或圆柱状。
11. 成长植株茎基部或中部以下的节间近圆柱状, 小枝的节间稍扁平, 宽 2—2.5 毫米, 干后具纵肋 2—3 条, 果椭圆状或卵球形, 长 4—5 毫米, 黄色或橙色, 果皮平滑…………… 11. 棱枝槲寄生 *V. diospyrosicolum* Hayata
11. 成长植株的茎和枝均圆柱状, 小枝的节间粗 1—1.5 毫米, 干后具纵浅沟, 果近球形, 长约 3 毫米, 果皮密生小疣…………… 12. 聚花槲寄生 *V. lorantheri* Elmer

组 1. 槲寄生组——Sect. *Viscum* Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 1: 193. 1889, et in Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 1: 140. 1897; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 16 b: 199. 1935.

雌雄异株植物。花序顶生或腋生于茎叉状分枝处; 雌花序聚伞式穗状, 具花 3—5 朵, 无不定花芽。

模式种: 白果槲寄生 *Viscum album* L.

本组约 10 种, 我国产 3 种、1 变种。

1. 槲寄生(中国高等植物图鉴) 冬青(辽宁), 寄生子(四川), 台湾槲寄生(台湾), 北寄生(中药志)

***Viscum coloratum*** (Kom.) Nakai, Rep. Veg. Degelet Isl. 17. 1919; Yamamoto, Suppl. Ic. Pl. Formos. 3: 20. 1927; F. Schulte in Fl. URSS 5: 411. 1936; 中国高等植物图鉴 1: 540, 图 1079. 1972; 秦岭植物志 1: 124, 图 105. 1974. — *V. album* L. ssp. *coloratum* Kom. in Act. Hort. Petrop. 22: 107. 1903; Nakai, Fl. Koreana 2: 179. 1911. — *V. alni formosanae* Hayata, Ic. Pl. Formos. 6: 39, f. 3. 1916; Danser in Blumea 4: 274. 1941; J. M. Chao in Fl. Taiwan 2: 250. 1976, *syn. nov.* —