

V. coloratum (Kom.) Nakai var. *alniformosanae* (Hayata) Iwata in Journ. Arg. Sci. Tokyo **3**: 179. 1956. — *V. album* auct. non L.: Lecomte in Sargent, Pl. Wils. **3**: 318. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **4**: 179. 1923; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 160. 1929; Danser in Blumea **4**: 268. 1941, pro parte; Sesh. Rao in Journ. Ind. Bot. Soc. **36**: 118. 1957, pro parte

灌木,高 0.3—0.8 米;茎、枝均圆柱状,二歧或三歧、稀多歧地分枝,节稍膨大,小枝的节间长 5—10 厘米,粗 3—5 毫米,干后具不规则皱纹。叶对生,稀 3 枚轮生,厚革质或革质,长椭圆形至椭圆状披针形,长 3—7 厘米,宽 0.7—1.5(—2) 厘米,顶端圆形或圆钝,基部渐狭;基出脉 3—5 条;叶柄短。雌雄异株;花序顶生或腋生于茎叉状分枝处;雄花序聚伞状,总花梗几无或长达 5 毫米,总苞舟形,长 5—7 毫米,通常具花 3 朵,中央的花具 2 枚苞片或无;雄花:花蕾时卵球形,长 3—4 毫米,萼片 4 枚,卵形;花药椭圆形,长 2.5—3 毫米。雌花序聚伞式穗状,总花梗长 2—3 毫米或几无,具花 3—5 朵,顶生的花具 2 枚苞片或无,交叉对生的花各具 1 枚苞片;苞片阔三角形,长约 1.5 毫米,初具细缘毛,稍后变全缘;雌花:花蕾时长卵球形,长约 2 毫米,花托卵球形,萼片 4 枚,三角形,长约 1 毫米;柱头乳头状。果球形,直径 6—8 毫米,具宿存花柱,成熟时淡黄色或橙红色,果皮平滑。花期 4—5 月,果期 9—11 月。

我国大部分省区均产,仅新疆、西藏、云南、广东不产。海拔 500—1400(—2000) 米阔叶林中,寄生于榆、杨、柳、桦、栎、梨、李、苹果,枫杨、赤杨、槭属植物上。苏联远东地区,朝鲜,日本也有分布。模式标本采自苏联哈巴罗夫斯克(伯力)。

全株入药,即中药材槲寄生正品,具治风湿痹痛,腰膝酸软,胎动、胎漏及降低血压等功效。

据观察 *Viscum alniformosanae* 的同模式标本 (Hayata s. n.) 和采自台湾的标本,其形态特征与大陆南北各省生长的槲寄生无差别,应予归并。

本种果实的颜色,据记录:寄生于榆树的呈橙红色,若寄生于杨树和枫杨的呈淡黄色,寄生于梨树和山荆子的果呈红色或黄色。如依果的颜色作变型标准而分类,则果成熟时黄色的为 *Viscum coloratum* f. *lutescens* (Makino) Kitag.; 果呈橙红色的为 *Viscum coloratum* f. *rubro-aurantiacum* (Makino) Kitag. 由于须待果成熟时才能鉴别,故本志不细分。

本种与欧亚大陆(喜马拉雅山以西地区)生长的白果槲寄生 *Viscum album*,除有明显地理分布间隔之外,果实颜色等也有区别。

2. 白果槲寄生

Viscum album L. Sp. Pl. 1023. 1753; Danser in Blumea **4**: 268. 1941, pro parte; Sesh. Rao in Journ. Ind. Bot. Soc. **36**: 118, f. 1. 1957, pro parte.

2a. 白果槲寄生(原变种)

Viscum album L. var. *album*