

我国不产。分布于欧洲南部和东部,非洲北部,亚洲喜马拉雅山以西温带地区。模式标本采自欧洲。

2b. 卵叶槲寄生(变种)(新拟) 阔叶槲寄生(云南植物志)

Viscum album L. var. **meridianum** Danser in Blumea 4: 274. 1941; 云南植物志 3: 379, pl. 110, 4.1983. — *V. costatum* Gamble in Kew Bull. 1913: 46. 1913. — *V. album* L. ssp. *meridianum* (Danser) Long in Not. Bot. Gard. Edinb. 40: 129. 1982, syn. nov. — *V. album* auct. non L.: Danser in Blumea 2: 55. 1936; Sesh. Rao in Journ. Ind. Bot. Soc. 36: 118, f. 2. 1957, quoad De 17461, Gamble 711.

灌木,高约 0.5 米;茎、枝均圆柱状,二歧地或多歧地分枝,枝的节间长 3—7 厘米,粗 2.5—6 毫米,干后具纵皱纹。叶对生,厚革质,倒卵形,长 3—5 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,顶端近圆形,基部楔形,叶缘稍背卷;基出脉 3—5(—7) 条;叶柄长约 5 毫米。雌雄异株;雄花序聚伞状,顶生,总花梗几无,具花 3 朵,中央的花具 2 枚苞片,侧生的花各具一枚苞片;苞片三角形,长 2—3 毫米;雄花:花蕾时近球形,长约 2 毫米,萼片 4 枚,三角形;花药椭圆形;雌花序聚伞式穗状,顶生或腋生于茎叉状分枝处,总花梗长约 2 毫米,具花 3—5 朵,顶生的花具 2 枚苞片或无,交叉对生的花各具一枚苞片;苞片三角形,长 2—2.5 毫米;雌花:花蕾时卵球形,长 2.5—3 毫米;花托卵球形;萼片 4 枚,三角形,长 1.5—2 毫米;柱头乳头状。果椭圆状,长 8 毫米,直径 6 毫米,宿存花柱长约 1 毫米,黄色,果皮平滑。花期 11 月至翌年 3 月,果期 7—11 月。

产于西藏(察隅、吉隆),云南。海拔 1300—2400(—2700) 米山地阔叶林中,寄生于樱桃、花椒、核桃、云南鹅耳枥等植物上。不丹、锡金、印度东北部、缅甸北部、越南北部也有分布。模式标本采自印度那加山。

本变种的叶片呈倒卵形,通常长度为宽度的 2 倍,决不超过 2.5 倍;白果槲寄生(原变种)其叶片椭圆形至披针形,长度为宽度的 3—5 倍;本变种在我国仅见于滇藏,它与槲寄生的分布区有一定间隔。

3. 线叶槲寄生(新拟) 寄生(四川)

Viscum fargesii Lecomte, Nct. Syst. 3:173. 1915; Danser in Blumea 4: 275. 1941.

灌木,高 15—50 厘米;茎圆柱状,通常二歧地分枝,节间长 6—11 厘米,粗 2—4 毫米,枝的节间,长 3—8 厘米,粗 1—1.5 毫米。叶对生,革质,线形,长(2—)3—5 厘米,宽(1—)2—4 毫米,顶端圆钝,基部渐狭;叶脉不明显;叶柄短。雌雄异株;雄花序聚伞状,顶生,具花 3—1 朵,总花梗几无,雄花:花蕾时近球形,长约 3 毫米,萼片 4 枚;雌花序聚伞式穗状,顶生或腋生于茎叉状分枝处,总花梗长 2—4 毫米,具花 3—5 朵,顶生的花具 2 枚苞片或无,交叉对生的花各具一枚苞片,苞片三角形,长约 2 毫米,初具细缘毛,后变全缘;雌花:花托卵球形,长 0.5 毫米;萼片 4 枚,长约 1 毫米。果卵球形,长 4.5—5 毫米,直径约 3 毫米,绿色,果皮平滑。花期 6—7 月,果期 7—10 月。

产于四川北部和东北部、甘肃南部、青海(互助)、陕西南部、山西南部。海拔 1350—2300 米山地、沟谷或河边阔叶林中，寄生于山杨或山楂等植物上。模式标本采自四川城口。

本种近似槲寄生，但区别是枝的节间细长，叶线形，通常宽 2—4 毫米，嫩叶更狭，本种原始记载雌花和雄花同株，实误。

4. 绿茎槲寄生(云南植物志)

Viscum nudum Danser in Blumea **4**: 275. 1941; 云南植物志 **3**: 378. 1983.

灌木，高 0.3—0.5 米；茎圆柱状，绿色或黄绿色，二歧地或三歧地分枝，枝的节间长 4—8 厘米，粗 2—5 毫米，干后具皱纹。叶退化呈鳞片状，长 0.5—1 毫米。雌雄异株；雌、雄花序均聚伞式穗状，顶生或腋生于茎叉状分枝处，总花梗长 2—5 毫米，通常具花 3—5 朵，顶生的花具 2 枚苞片，交叉对生的花各具一枚苞片；苞片三角形，长 1 毫米，具短缘毛或全缘；雄花：花蕾时卵球形，长约 3 毫米，黄色，萼片 4 枚，卵状三角形；花药椭圆形，长约 1.5 毫米；雌花：花蕾时长卵球形，长 2—2.5 毫米，花托卵球形；萼片 4 枚，三角形，长约 0.5 毫米；柱头乳头状。果卵球形，长 5—6 毫米，直径 4 毫米，黄绿色，果皮平滑。花期 12—3 月，果期 8—10 月。

产于云南、四川、贵州西北部。海拔 2150—3800 米山地阔叶林中，寄生于杨属、柳属、榛属或化香树、滇青冈、桦树、梨树、桃树等植物上。模式标本采自四川康定。

全株入药，有祛风湿、安胎等功效(四川甘孜)。

组 2. 腋花槲寄生组——Sect. Botryoviscum Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. **1**: 140. 1897; Engl. u. Krause in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **16** b: 201. 1935.

雌雄同株植物。聚伞花序腋生，偶顶生，雌花和雄花同序，具不定花芽或无不定花芽。

模式种：扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* Brum. f.

本组约 60 种，我国产 8 种。

5. 云南槲寄生(植物分类学报)

Viscum yunnanense H. S. Kiu in Act. Phytotax. Sin. **22** (3): 206, f. 1. 1984.

亚灌木，高约 0.6 米；枝交叉对生，圆柱状，节间长 2—4.5 厘米，粗 2—3 毫米，具细纵棱。叶对生，薄革质，椭圆形或披针形，长 6—8 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端钝或渐尖，基部渐狭，基出脉 5 条；叶柄短。扇形，聚伞花序，2—3 个腋生，总花梗长 2—3 毫米，总苞舟形，长约 3 毫米，具花 5—7 朵；花排列成一行，中央一朵为雄花，侧生的均为雌花；雄花：花蕾时卵球形，长约 2 毫米，花托长 1 毫米；萼片 4 枚，三角形，长 1 毫米；花药椭圆形，长 0.5 毫米；雌花：花蕾时椭圆状，长 2—2.5 毫米，花托长 1.5—2 毫米；萼片 4 枚，三角形，长约 0.5 毫米；柱头乳头状。果序具果 4—6 个，果椭圆状，长 5 毫米，直径约 2.5 毫米，顶端钝，黄